

Blæreskylning med Uracyst®

Du skal behandles med lægemidlet Uracyst® mod din kroniske blærebetændelse. Kronisk blærebetændelse er blærebetændelse uden bakterier, men med irritation af blærevæggen.

Sådan virker medicinen

Irritation af blærevæggen opstår, fordi det beskyttelseslag, der ligger på oversiden af blærevæggen, er ødelagt. Derfor kan affaldsstoffer fra urinen komme i direkte kontakt med de dybere lag i blærevæggen. Det kan give stærke smerter, sammentrækninger af blæren samt betændelsestilstande i blæren.

Uracyst® indeholder et stof, som kan erstatte beskyttelseslaget i blæren og derved forhindre, at affaldsstofferne fra urinen kommer i kontakt med blærevæggen.

Sådan foregår den medicinske behandling

Uracyst® er en væske, og behandlingen foregår som blæreskylning. Det vil sige, at vi lægger et kateter via dit urinrør op i din blære og tømmer den helt for urin. Derefter fylder vi blæren med Uracyst® gennem kateteret. Væsken skal blive i blæren så længe som muligt, minimum 30 minutter, for at få den bedste effekt af behandlingen.

Efter minimum 30 minutter lader du vandet og tømmer på den måde væsken ud af blæren.

Du skal have blæreskylning 1 gang om ugen. Vi vurderer løbende, hvor mange behandlinger du skal have, da det afhænger af, hvor godt behandlingen virker.

Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger ved behandlingen. Nogle oplever let irritation omkring urinrøret og i blæren efter at have haft kateteret i blæren.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Ambulatorium for Urinvejskirurgi

Sekretær

Tlf. 97 64 18 58

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 9.00 – 12.00

Sygeplejerske

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst: Mandag - fredag **13.00 – 14.00**