

Medicinsk behandling med Xgeva (denosumab)

Du skal i behandling med lægemidlet Xgeva (denosumab). Xgeva (denosumab) stabiliserer knoglevævet og forebygger nedbrydning af knoglerne.

Sådan virker medicinen

I normalt knoglevæv foregår der en løbende nedbrydning og opbygning af knoglerne. Når prostatakræft har spredt sig til knoglerne, fremskyndes denne nedbrydning og dermed risikoen for knoglebrud. Xgeva (denosumab) forsinker knoglenedbrydning, der skyldes kræft.

Xgeva (denosumab) kan ikke helbrede kræft, men lægemidlet kan hjælpe med at formindske smerter og nedsætte forhøjet kalkindhold i blodet.

Sådan foregår den medicinske behandling

Du får Xgeva (denosumab) som indsprøjtning under huden på maven. Du skal have en indsprøjtning hver 4. uge.

Behandlingen foregår som regel på hospitalet hver 3. måned. De 2 mellemliggende indsprøjtninger kan din egen læge give dig. Du får medicinen med fra hospitalet.

Få taget en blodprøve inden behandlingen

Cirka 1 uge før hver behandling skal du have taget en blodprøve hos din læge eller på hospitalet. Blodprøver viser dit kalk- og saltniveau, samt hvordan dine nyrer fungerer. I nogle tilfælde er det ikke nødvendigt med en blodprøve. Det aftales ved kontrollerne.

Tag kalktilskud og D-vitamin

Du skal tage dagligt tilskud af kalk og D-vitamin, mens du er i behandling med Xgeva (denosumab) og medicin for prostatakræft, da dette tilskud medvirker til at opretholde et normalt kalkindhold i blodet.

Bivirkninger

Der er bivirkninger forbundet med behandlingen med Xgeva (denosumab), men ikke alle får disse bivirkninger.

Fortæl os straks, hvis du oplever ét eller flere af nedenstående symptomer, mens du er i behandling med Xgeva (denosumab).

Meget almindelige bivirkninger

Rammer mere end 10 % af patienterne:

- Åndenød/stakåndethed
- Muskel- og skelet smerter
- Diarré.

Almindelige bivirkninger

Rammer mellem 1 % og 10 % af patienterne:

- Beskadigelse af knoglen i kæben (osteonekrose)
- Øget risiko for lavt kalkniveau og lavt fosfatniveau
- Øget svedproduktion
- Behov for tandudtrækning.

Tal eventuelt med din læge eller tandlæge om disse bivirkninger.

Problemer med mund, tænder eller kæbe

I almindelige tilfælde (1 ud af 10 patienter) ses beskadigelse af kæbeknoglen (osteonekrose). Symptomer på osteonekrose, som du skal være opmærksom på:

- Smerter i munden og/eller kæben
- Hævelse i kæben eller omkring kæben
- Sår i munden
- Manglende heling efter tandudtrækning
- Fornemmelse af følelsesløshed eller en følelse af tyngde i kæben
- En tand, der bliver løs
- Betændelse eller blødninger i munden.

Oplever du nogle af disse symptomer, skal du kontakte os eller din tandlæge.

Vær opmærksom på

Få tandeftersyn inden behandlingen

Vi anbefaler, at du får et grundigt tandeftersyn, inden du begynder behandlingen med Xgeva (denosumab), da eventuelle huller i tænderne eller paradentose skal behandles, før du kan få Xgeva (denosumab).

Det er vigtigt dagligt at have en god mundhygiejne.

Fortæl altid din tandlæge, at du er i behandling med Xgeva (denosumab).

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Ambulatorium for Urinvejskirurgi

[Sekretær](#)

Tlf. 97 64 18 58

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 9.00 – 12.00

[Sygeplejerske](#)

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst: Mandag - fredag **13.00 – 14.00**