

Behandling af rytmeforstyrrelser i hjertet med Flecainid

Du skal i behandling med Flecainid på grund af din uregelmæssige hjerterytme.

Behandling med Flecainid opstartes under indlæggelse. Her bliver du hjerteovervåget i 2 døgn, hvor vi holder øje med, om der ses hjerterytmeforstyrrelser.

Sådan virker medicinen

Flecainid virker ved at stabilisere de elektriske impulser i hjertet. Formålet med behandlingen er at holde din hjerterytme normal, så du kan undgå de gener, som en uregelmæssig hjerterytme kan give.

Du skal tage Flecainid-tabletterne på tom mave eller 1 time før næste måltid.

Sådan foregår opstart af behandlingen

Før din indlæggelse skal du have taget blodprøve og hjertekardiogram, så vi kan sikre os, at alt er som det skal være inden opstart af Flecainid-behandlingen.

Mulige bivirkninger

Flecainid kan give hovedpine, sløret syn, træthed og svimmelhed.

I sjældne tilfælde – specielt i starten – kan Flecainid provokere andre og farligere rytmeforstyrrelser i hjertet.

Kontakt lægen ved bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, er det vigtigt, at du ikke stopper med at tage medicinen. Kontakt den læge eller afdeling, der har ordineret medicinen, eller din praktiserende læge, for at aftale, hvordan du skal forholde dig.

Kontrol

Du skal have kontrolleret blodprøver og hjertekardiogram hvert halve år. Desuden skal du tale med hjertesygeplejersken enten via telefon eller ved fremmøde hos os én gang årligt.

Vær opmærksom på

Behandlingen må ikke anvendes ved hjertesvigt eller betydende kranspulsåreforsnævring på grund af øget risiko for at fremprovokere alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

Hvis du oplever, at din hjerterytme igen er uregelmæssig, eller oplever udtalt svimmelhed eller besvimelse, skal du henvende dig til os.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Ambulatorium for Hjertemedicin

Tlf. 97 64 08 39

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 7.00 – 19.00