

Undersøgelse af hormonproduktion i binyrerne (synacthentest)

Du skal have foretaget en såkaldt synacthentest. Formålet med testen er at undersøge, om din evne til at danne binyrebarkhormon er normal.

Du danner binyrebark ved hjælp af et hypofysehormon, der hedder ACTH (adrenocorticotroph hormoner). ACTH-hormonet stimulerer både dannelse og frigivelse af binyrebarkhormon fra binyrerne.

Ved denne undersøgelse benytter vi en syntetisk udgave af ACTH til at stimulere din produktion af binyrebarkhormon. Deraf navnet 'syn-achten-test'.

Sådan foregår undersøgelsen

Vi lægger en kanylen (venflon) ind i en blodåre i din hånd.

Vi tager en blodprøve i din albuebøjning.

Vi sprøjter ACTH ind i din blodåre via kanylen. Hermed stimuleres hormonproduktionen i dine binyrer.

Efter 30 minutter tager vi nye blodprøver i albuebøjningen for at måle hormonproduktionen.

Herefter fjerner vi kanylen fra din hånd.

Undersøgelsen varer cirka 1 time.

Sådan forbereder du dig

Hold pause med medicin med binyrebarkhormon

Hvis du er i behandling med prednisolon, hydrocortison eller andre præparater med binyrebarkhormon, skal du aftale med lægen, om du skal holde pause i flere dage op til undersøgelsen.

Når du kommer hjem

Svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen ved en samtale med den behandlende læge eller per brev eller telefon fra den henvisende læge fra anden hospitalsafdeling.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Intern Medicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 64 28 22

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 12.00