



CT-scanning af tyktarmen (screening)

Du skal have foretaget en CT-scanning, som er en computerstyret røntgenfotografering med meget detaljerede billeder.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Tarmen fyldes med luft

For at vi kan undersøge tyktarmen, skal du have pustet luft ind gennem et blødt plastkrør, der bliver lagt op i endetarmen. Luften kan give en følelse af oppustethed og måske kortvarigt mavekneb, fordi tarmen trækker sig sammen.

Derfor får du en indsprøjtning med et medikament, som får tarmen til at slappe af.

Selve undersøgelsen

Under undersøgelsen ligger du på et leje, som bevæger sig hurtigt gennem en åbning i CT-scanneren, mens der tages billeder med få millimeters afstand af det ønskede område. CT-scanningen udføres, mens du ligger på ryggen, men du skal også ligge på maven eller siden til en serie billeder.

Afsæt 45 minutter til undersøgelsen

Undersøgelsen varer cirka 45 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Følg diæt

For at bibeholde en tom tarm må du kun få flydende kost, indtil undersøgelsen er overstået.

Det kan være:

- bouillon uden fyld
- saftsuppe uden fyld
- tynd kaffe eller te uden fløde – men gerne med sukker
- juice uden frugtkød

- saftevand
- danskvand
- lys øl
- sodavand
- vand.

Du må **ikke** drikke mælkeprodukter.

Hvis du har sukkersyge

Hvis du får insulin, skal du kontakte Billeddiagnostisk Afsnit på tlf. 97 64 21 68 mellem klokken 8.00-15.00.

Drik den udleverede væske

Du har fået udleveret kontrastvæske, som du skal drikke inden undersøgelsen. Se den vedlagte vejledning.

NÅR DU KOMMER HJEM

Svar på undersøgelsen

Det ambulatorium, der har henvist dig til undersøgelsen, får svar på undersøgelsen senest 6 hverdage efter undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Billeddiagnostisk Afsnit Frederikshavn

Tlf. 97 64 21 38

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30



Vejledning – kontrastvæske Gastrografin®

DU SKAL DRIKKE KONTRASTVÆSKE

Du har fået udleveret en flaske, som indeholder 100 ml Gastrografin®. Det skal du drikke på følgende måde:

Dagen før undersøgelsen

Kl. _____

20 ml Gastrografin® blandet med 1 dl vand

Kl. _____

20 ml Gastrografin® blandet med 1 dl vand

Kl. _____

20 ml Gastrografin® blandet med 1 dl vand

Kl. _____

20 ml Gastrografin® blandet med 1 dl vand

Kl. _____

20 ml Gastrografin® blandet med 1 dl vand

Gastrografin® blander sig med eventuel tilbageværende væske i tarmen og gør det lettere for lægen at vurdere billederne.

Gastrografin® virker også som et let afføringsmiddel.

Gastrografin® kan holde sig i 3 døgn, når flasken har været åbnet.

Skal opbevares ved stuetemperatur.