



Røntgenundersøgelse af spiserøret

Du skal have foretaget en røntgenundersøgelse af spiserøret. Undersøgelsen foregår med hjælp fra kontrastvæske, som du skal drikke. Kontrastvæsken gør, at billederne bliver mere tydelige.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du skal stå op eller sidde ned under undersøgelsen. Imens der tages billeder fra forskellige vinkler, skal du drikke kontrastvæske. Kontrastvæsken er kold, tyktflydende og uden smag. Du skal drikke cirka 1 glas kontrastvæske.

Undersøgelsen varer cirka 30 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Spis kun flydende kost inden undersøgelsen

For at opnå de mest tydelige billeder ved undersøgelsen, må du kun indtage en mindre mængde flydende kost i de sidste 6 timer inden undersøgelsen.

Det kan fx være supper eller drikkeyoghurt uden faste bestanddele.

NÅR DU KOMMER HJEM

Spis som normalt

Når undersøgelsen er overstået, må du spise og drikke som normalt resten af dagen.

Du kan opleve problemer med afføring

I 2-3 dage efter undersøgelsen kan din afføring være lys, og du kan få forstoppelse på grund af kontrastvæsken. Det kan afhjælpes ved at drikke 2 liter væske og spise groft brød, grøntsager og frugt.

Svar på undersøgelsen

Hvis du er henvist af din egen læge, kan du ringe dertil og få svar efter 5 hverdage.

Hvis det er et ambulatorium på sygehuset, der har henvist dig, vil du få svar per brev derfra – medmindre du har en anden aftale.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring

Tlf. 97 64 12 61

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30