

# Behandling af forhudsforasnævring med binyrebarkhormoncreme

Dit barn skal behandles med binyrebarkhormoncreme, som i de fleste tilfælde kan afhjælpe forhudsforasnævring.

Undersøgelser har vist, at 70-90 % af de børn, der bliver behandlet med binyrebarkhormoncreme, opnår et fuldt tilfredsstillende resultat, hvor forhuden efter behandlingen kan trækkes tilbage uden besvær.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Forhudsforasnævringen skal behandles med Diproderm® 0,05%, som du skal smøre barnet med 2 gange dagligt i 4 uger. Behandlingen tilbydes ikke til børn under 1 år.

Stram forhuden let op, så den forsnævrede del af forhuden ses tydeligt. Smør herefter et tyndt lag creme fra spidsen af forhuden til det sted, hvor kanten af penishovedet aftegnes gennem forhuden.

Efter 2 ugers behandling skal barnets forhud trækkes længere og længere tilbage. Tilbagetrækningen skal helst udføres flere gange dagligt.

Hvis forhuden trækkes helt tilbage over penishovedet, skal du være opmærksom på, at forhuden trækkes på plads igen, så penishovedet og forhuden ikke hæver. Denne hævelse kan nemlig umuliggøre, at forhuden kan trækkes tilbage over penishovedet (paraphimosis).

Behandling med hormoncreme må ikke fortsætte ud over de 4 uger. Efter 4 uger skal effekten af behandlingen vurderes. Hvis forhuden stadig er generende svæver, kan barnet henvises til operation.

## BIVIRKNINGER

I undersøgelser af effekten af behandling med binyrebarkhormoncreme er der ikke observeret nogle bivirkninger af behandlingen, og behandlingen påvirker ikke barnets egen produktion af binyrebarkhormon.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Undgå at smøre hormoncreme på selve penishovedet og på dine egne og barnets fingre. Vask altid hænder efter påsmøring.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Ambulatorium for Børn og Unge

Sygeplejerske:

Tlf. 97 64 10 22

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00