



Behandling med Plaquenil®

Du skal i behandling med medicinen Plaquenil®.

Plaquenil® er et langsomt virkende gigtmiddel med få bivirkninger. Det bruges ved leddegigt, men også til behandling af malaria og visse hud- og bindevævs-sygdomme.

Behandlingen modvirker ømhed, smerter, hævelse og stivhed af leddene. 2/3 af patienter, der bruger Plaquenil®, har effekt af behandlingen.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Plaquenil® virker ved at dæmpe betændelsesreaktioner i leddene. Betændelsesreaktionerne er det, du mærker som smerter, varme, rødme, hævelse og stivhed. Lægemidlet kan ikke påvirke knogle- og bruskskader, der allerede er udviklet, men det kan hæmme nye.

Ved leddegigt indtræder virkningen efter 3-6 måneders behandling. Hvis medicinen ikke har virket efter 6 måneder, opgives behandlingen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Behandlingen består af en tablet på 200 mg dagligt. Tabletten skal synkes hel eller eventuelt deles, og tages med et glas vand.

BIVIRKNINGER

Langt de fleste tåler lægemidlet uden bivirkninger. I starten af behandlingen kan disse bivirkninger forekomme:

- let mavebesvær, træthed og hovedpine

- hududslæt forårsaget af sollys. Vi anbefaler derfor, at du minimum bruger solfaktor 10 i sommermånederne.

Sjældnere bivirkninger er:

- hudreaktioner
- hørenedsættelse
- muskelsvækkelse eller knoglemarvspåvirkning.

Disse bivirkninger forsvinder hurtigt ved pause med medicinen. Efter en pause kan du som regel genoptage behandlingen efter aftale med lægen.

Ved lang tids behandling, over 5 år, kan der i sjældne tilfælde komme aflejring af Plaquenil® i øjets net-hinde. Hvis det ikke opdages, kan det påvirke synet. Vi aftaler derfor med dig, hvornår du eventuelt skal undersøges hos en øjenlæge.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt din læge ved tegn på infektion

Får du høj feber eller andre tegn på infektion, skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten. Der kan være grund til en ekstra blodprøvekontrol af blodprocent og hvide blodlegemer, som skal sendes til akut analyse på sygehuset.

Hold pause med Plaquenil ved infektion

Får du en infektion, der skal behandles med antibiotika, skal du holde pause med Plaquenil®. Du kan genoptage behandlingen, når du ikke længere får antibiotika. Rådfør dig med din læge, reumatolog eller gigtsygeplejerske.

Tag gerne Plaquenil, selvom du er gravid eller ammer

Du kan anvende Plaquenil® under graviditet og amning. Der er ikke påvist fosterskader i forbindelse med behandlingen.



KONTROL

Du vil få taget blodprøver ved indledning af behandling, og når sygdommen i øvrigt kontrolleres med 3-6 måneders interval.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om leddegigt, kan du eventuelt læse mere på patienthaendbogen.dk.

FORNYELSE AF RECEPT

Skal du have fornyet din recept på lægemidlet, så kontakt gigtsygeplejersken.



Kontakt

Mandag – fredag 8.00-15.00

Reumatologisk Afdeling

Tlf. 97 64 09 90

Gigtsygeplejersken

97 64 09 79

97 64 09 84

97 64 09 85

97 64 09 86

97 64 25 83