



## Gulsot hos nyfødte

Nogle nyfødte får gulsot. Gulsot viser sig 1-2 dage efter fødslen.

Gulsot skyldes, at barnets lever er umoden, samtidig med at barnet ved fødslen har overskud af røde blodlegemer. De røde blodlegemer nedbrydes og omdannes blandt andet til det gule farvestof bilirubin, som leveren normalt renses blodet for. Farvestoffet ophobes i blodet og kan farve huden gul.

### VÆR OPMÆRKSOM PÅ GULSOT

Er barnets hud ganske let gullig, skal du holde øje med, om den gule farve tiltager. Hvis barnets hud bliver mere gul, skal du kontakte din sundhedsplejerske eller læge, så de kan vurdere barnets tilstand.

Hvis barnet har meget gulsot, kan det blive sløvt. Så vil barnet ikke spise, og det kan blive svært at få kontakt med det. Sker det, skal du hurtigst muligt kontakte jeres læge eller Lægevagten.

Lægen kan tage en blodprøve fra barnet for at se, hvor meget bilirubin der er i barnets blod. Er indholdet af bilirubin for højt, bliver barnet indlagt og behandlet med lys. Behandlingen er nødvendig, da meget kraftig ubehandlet gulsot kan give hjerneskade.

Hvis barnet får gulsot efter 2 uger, skal du kontakte jeres læge.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



#### Kontakt

**Fødegangen, Hjørring**  
Tlf. 97 64 06 86

**Barselsambulatoriet**  
Tlf. 97 64 07 04

### KONTAKT OG MERE VIDEN