



Forstørret nakkefold hos fosteret

Hvis en skanning af dit foster har vist, at fosteret har forstørret nakkefold, betyder det ikke nødvendigvis, at fosteret er sygt. Der er dog en let øget risiko for sygdomme som fx hjertefejl, misdannelser, kromosomfejl og visse sjældne sygdomme.

Derfor undersøger vi dit foster yderligere i form af en skanning og eventuelt en moderkageprøve.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Nogle gravide, der får konstateret forstørret nakkefold hos fosteret, bliver tilbudt en moderkageprøve eller fostervandsprøve for at udelukke Downs syndrom eller en anden genetisk fejl. Læs eventuelt pjecen "Moderkageprøve og fostervandsprøve." Som regel viser moderkageprøven, at kromosomerne eller generne er normale.

Uanset om du får foretaget en moderkage- eller en fostervandsprøve eller ej, tilbyder vi, at du kan få en ekstra ultralydsskanning af fostrets hjerte samt en skanning for misdannelser.

Langt de fleste fostre med forstørret nakkefold er ikke syge, men har en variation i nakkefoldens størrelse.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. I kan også læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk



Kontakt

Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd
Tlf. 97 64 07 25
Telefontid: Mandag – fredag 8.00 – 11.00
og 13.30 – 14.30