



Kikkertundersøgelse af livmoderen

Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af din livmoder. Undersøgelsen kaldes også en hysteroskopi.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Ved undersøgelsen ligger du på samme måde som til en almindelig gynækologisk undersøgelse. Du bliver eventuelt lokalbedøvet omkring livmoderhalsen.

Lægen fører en tynd kikkert op i livmoderen gennem livmoderhalsen. Lægen skyllet livmoderhulen med saltvand for at få et godt overblik. Skyllningen kan give dig menstruationslignende smerter.

Gennem kikkerten kan lægen se, om der er forandringer i livmoderhulen og eventuelt tage prøver.

Undersøgelsen varer cirka 30 minutter.

Hvis lægen tager prøver, bliver prøverne sendt til videre undersøgelse.

Mulige komplikationer

Oftest er der ingen komplikationer forbundet med undersøgelsen. I sjældne tilfælde kan der dog opstå et lille hul i livmodervæggen. Sker det, afbryder vi undersøgelsen. Sjældent kan der også opstå betændelse i livmoderen efter undersøgelsen.

Af og til viser det sig, at undersøgelsen ikke kan gennemføres uden fuld bedøvelse. Hvis det er tilfældet, afbrydes undersøgelsen, og du får tid til en ny undersøgelse med hjem.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Kontakt os, hvis du har menstruation

Du må ikke have menstruation, når du skal undersøges. Det kan forstyrre resultatet af undersøgelsen.

Hvis din menstruation falder sammen med undersøgelsen, skal du hurtigst muligt kontakte os, så vi kan aftale en ny tid. Hvis du har mistanke om, at du er gravid, skal du lave en graviditetstest. Er den positiv, skal du kontakte os.

Tag smertestillende medicin inden undersøgelsen

Vi anbefaler, at du tager smertestillende medicin 2 timer før, du skal møde til undersøgelsen. Tag 2 tabletter paracetamol á 500 mg og 2 tabletter ibuprofen á 200 mg. Du kan købe medicinen i håndkøb på apoteket.

Du skal ikke faste

Du skal ikke møde fastende til undersøgelsen.

EFTER UNDERSØGELSEN

Du kan tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Du aftaler med lægen, om du skal til kontrol i Gynækologisk Ambulatorium eller have brevsvær.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent at have trykkende smerter

De første timer efter undersøgelsen kan du opleve trykkende og murrende smerter i underlivet. Du kan lindre smerterne med samme smertestillende medicin som før undersøgelsen.

Genoptag dit arbejde

Du kan genoptage dit arbejde dagen efter undersøgelsen.

Blødning og udflåd

Du kan have en let blødning og/eller gulligt udflåd i nogle uger efter undersøgelsen. Det gælder især, hvis der er fjernet muskelknuder eller polypper.



Søg læge, hvis du får:

- kraftig blødning, mere end ved kraftig menstruation
- smerter i underlivet, der er kraftigere end almindelige menstruationssmerter
- temperatur over 38 grader
- ildelugtende udflåd.

Dette kan være tegn på begyndende underlivsbetændelse, som skal undersøges.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, eller oplever du problemer, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Det første døgn efter undersøgelsen kan du kontakte:

Gynækologisk Sengeafsnit 105
Tlf. 97 64 07 14

Derefter:

Ambulatorium for Gynækologi
Tlf. 97 64 07 41
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.15 – 11.00 og
13.30 – 14.30