

Behandling af rift ved endetarmen

Du har fået konstateret en rift eller revne ved endetarmen, også kaldet en analfissur. Revnen eller riften opstår, når vævet ved endetarmen overstrækkes.

Det kan ske i en periode, hvor du har meget hård afføring. Hvis tilstanden fortsætter, får revnen ikke ro til at hele, men bliver tværtimod dybere og sæde for et kronisk sår.

Lukkemusklen kan også blive for stram, så der af den grund opstår revner, når du presser for afføring.

Tilstanden giver anledning til:

- kløe
- lidt blødning (blod på toiletpapiret)
- stærkere smerter i forbindelse med toiletbesøg.

Sådan foregår undersøgelsen

Endetarmen undersøges ved, at et lille plastikrør (anoskop) føres ind i endetarmen. Gennem dette rør er det muligt at undersøge slimhinden i de yderste 10 centimeter af endetarmen.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Hvis vi konstaterer, at du har en meget stram lukkemuskel eller en kronisk revne/rift, skal du behandles med medicin. Enten diltiazem gel, 2 %, 30 ml eller nitroglycerinsalve (rectogesic). Du får en recept til medicinen.

Sådan bruger du medicinen

Salven påsmøres lige inden for endetarmsåbningen 3 gange dagligt i 6 uger. Salven vil virke smertelindrende samt give øget blodgennemstrømning til vævet, så revnen bedre kan heles.

Spis sundt, drik rigeligt og bevæg dig

- Spis en sund, varieret kost med mange fibre.

- Undgå forstoppelse. Hold maven i gang med fx svesker, sveskejuice, kosttilskud med loppefrøskaller eller tabletter med magnesiumoxid (fås i håndkøb på apoteket).
- Husk at bevæge dig.
- Drik meget, mindst 2 liter dagligt.

BIVIRKNINGER

Medicinsk behandling

Både diltiazem gel og nitroglycerinsalve kan som bivirkning give hovedpine, som dog aftager efter nogle dage.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Endoskopi AK1

Tlf. 97 64 18 88

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00