

Undersøgelse for allergi med priktest

Du skal have lavet en priktest, fordi der er mistanke om, at du er overfølsom over for et stof – også kaldet et allergen.

Ved en standardundersøgelse undersøges for allergi over for græs, birk, bynke, hest, kat, hund, husstøvmider og skimmelsvampe.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Priktesten er en hudtest, som vi laver på indersiden af din underarm.

Først renser en sygeplejerske huden og sætter tape med numre på. Ud for hvert nummer lægges en dråbe af et allergen. Herefter prikker sygeplejersken med en lille, ren nål igennem dråben og ind i hudens yderste lag.



Hvis du er allergisk, vil der efter cirka 10 minutter opstå rødme, hævelse og kløe i huden, dér hvor dråben er lagt. Reaktionen aftager cirka 2 timer efter undersøgelsen.

Du kan godt reagere positivt på testen, selvom du aldrig har reageret allergisk over for det pågældende stof.

Ud over de små prik og kløe, hvis testen er positiv, er der ingen gener forbundet med undersøgelsen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Hold pause med antihistaminer

De sidste 3 dage før testen må du ikke tage antihistamin-tabletter, som anvendes ved høfeber og nældefeber.

Undgå creme på underarmen på testdagen

Du må ikke smøre creme eller badesæbe med creme på underarmen samme dag, som du skal have lavet testen.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du får svar på priktesten af lægen i ambulatoriet, inden du tager hjem.

Vi sender også besked til din praktiserende læge med resultatet af allergitesten, medmindre du ikke ønsker det.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Lungemedicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 64 08 21

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 og
13.30 – 14.30