



Kikkertundersøgelse af blæren

Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren, også kaldet en cystoskopi. Med undersøgelsen kan vi undersøge blærens slimhinde og samtidig kontrollere din blære for polypper, udposninger, fortykkelser, sår eller stendannelser.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du får lagt en lindrende gel i urinrøret. Herefter fører vi et tyndt kikkertør op i blæren og fylder blæren med lunkent, sterilt saltvand. Det gør, at vi bedre kan se den indvendige side af blæren.

Undersøgelsen varer 5-10 minutter, og du får så vidt muligt svar på undersøgelsen med det samme. Hvis vi sender nogle prøver til yderligere undersøgelse, aftaler vi, hvordan du får svar på prøverne.

NÅR DU KOMMER HJEM

Du kan have gener efter undersøgelsen

Du kan have svie ved vandladning i op til 1 døgn efter undersøgelsen. Du kan også opleve blod i urinen. Det er helt normalt og skyldes, at kikkerten kan have lavet små rifter i dit urinrør.

Drik rigeligt vand

Sandsynligheden for, at du får blærebetændelse er større end normalt efter undersøgelsen. For at forebygge dette er det vigtigt, at du drikker mindst 2 liter væske resten af døgnet. På den måde får du skyllet blæren godt igennem. Hvis du får symptomer på blærebetændelse, skal du kontakte din egen læge.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om kikkertundersøgelse af blæren, kan du eventuelt læse mere på patienthåndbogen.dk. Søg på: 'cystoskopi'.



Kontakt

Urologisk Afsnit

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.30 – 15.00