



Medicinsk behandling med Eligard®

Du skal behandles med hormonet Eligard®, som hæmmer udviklingen af prostatakræft og mindsker eventuelle følger af sygdommen, fx træthed og problemer med vandladning.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Eligard® blokerer for det mandlige kønshormon testostérons stimulerende effekt på kræftcellerne. Kræftcellerne er afhængige af testosteron for at kunne vokse og dele sig. Når produktionen af testosteron er hæmmet, mindsker det væksten af kræftceller i prostata.

Eligard® kan ikke helbrede prostatakræft, men lægemidlet kan hindre, at sygdommen udvikler sig og eventuelt spreder sig til andre steder i kroppen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have Eligard® som indsprøjtninger i huden på maven. En læge eller sygeplejerske giver dig indsprøjtningerne.

Eligard® lægger sig som et depot under huden, hvorfra medicinen frigives løbende under behandlingsperioden. Du kan eventuelt mærke depotet som en lille kugle under huden.

Du skal have indsprøjtning med Eligard® hver 3. eller hver 6. måned. Du skal være i behandling med Eligard® resten af dit liv.

Eventuel behandling med antihormon

I nogle tilfælde er det nødvendigt med en forbehandling med tabletter med antihormon (Bicalutamid). Tabletterne modvirker den stigning af testosteron, som Eligard® forårsager ved starten af behandlingen.

KONTROL

Du skal komme til kontrol hver 3. måned. Cirka 1 uge inden kontrollen skal du have taget en blodprøve hos

din egen læge eller på sygehuset. Blodprøven fortæller os, om behandlingen virker efter hensigten. Ved kontrollen taler du med en læge eller en sygeplejerske. Vi drøfter virkningen af behandlingen, om du er generet af bivirkninger, og hvordan vi eventuelt kan mindske generne.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve irritation ved indstiksstedet efter hver indsprøjtning.

Når produktionen af testosteron hæmmes, kan du efter nogle uger eventuelt opleve én eller flere af følgende bivirkninger:

- Hedeture/svedeture
- Træthed
- Ændret fordeling af kropsvægt
- Utilpashed
- Manglende seksuel lystfølelse
- Impotens.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Afsnit

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.30 – 15.00