



Medicinsk behandling med Pamorelin®

Du skal i behandling med Pamorelin®. Pamorelin® er hormonindsprøjtninger, der er med til at hæmme udviklingen af prostatakræft og lindre eventuelle symptomer som træthed og problemer med vandladning.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Pamorelin® standser kroppens produktion af det mandlige kønshormon testosteron. Kræftcellerne er afhængige af testosteron for at kunne vokse og dele sig. Når produktionen af testosteron er stoppet, hæmmer det væksten af kræftceller i prostata.

Pamorelin® kan ikke helbrede prostatakræft, men lægemidlet kan hindre, at sygdommen udvikler sig og eventuelt spreder sig til andre steder i kroppen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du får sprøjtet Pamorelin® ind i sædemusklen. Doseringen er enten 11,25 mg hver 3. måned eller 22,5 mg hver 6. måned. En sygeplejerske giver dig indsprøjtningen.

Inden du får den første indsprøjtning, skal du behandles med antihormonet Bicalutamid. 14 dage efter, du har fået tabletten med Bicalutamid, begynder behandlingen med Pamorelin®.

Behandlingen med Pamorelin® er som regel livslang. Til hver behandling tager vi en blodprøve og kontrollerer dit PSA-tal. På den måde kan vi følge med i, hvordan behandlingen virker.

BIVIRKNINGER

Når produktionen af testosteron stopper, kan du efter nogle uger eventuelt opleve én eller flere af følgende bivirkninger:

- Rygsmerter
- Hedeture og svedeture
- Manglende lyst til sex
- Impotens
- Lettere vægtstigning, da din fedtfordeling ændres
- Påvirkning af dit humør
- Træthedsfornemmelse
- Muskelsvaghed
- Afkalkning af knogler
- Større og ømme brystkirtler
- Ændringer i hudens følesans
- Prikkende og stikkende fornemmelse i benene.

Når du kommer til kontrol, vil vi drøfte, om du er generet af eventuelle bivirkninger, og hvilke muligheder der er for at mindske dem.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Afsnit

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.30 – 15.00