



Medicinsk behandling med antihormon (Bicalutamid)

Du skal behandles med antihormonet Bicalutamid, som hæmmer udviklingen af prostatakrcæft og mindsker eventuelle følger af sygdommen, fx træthed og problemer med vandladning.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Bicalutamid er medicin, som blokerer for det mandlige kønshormon testosterons stimulerende effekt på kræftcellerne. Kræftcellerne er afhængige af testosteron for at kunne vokse og dele sig. Når produktionen af testosteron er hæmmet, mindsker det væksten af kræftceller i prostata.

Bicalutamid kan ikke helbrede prostatakrcæft, men lægemidlet kan hindre, at sygdommen udvikler sig og eventuelt spreder sig til andre steder i kroppen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Bicalutamid er en tablet, som du skal tage 1 gang dagligt. Behandlingen er som regel livslang.

Hver 3.-6. måned får du tid til kontrol i Urologisk Ambulatorium, hvor vi kontrollerer dit PSA-tal. Du skal have taget en blodprøve cirka 1 uge før. På den måde kan vi følge med i, hvordan behandlingen virker.

BIVIRKNINGER

Når produktionen af testosteron hæmmes, kan du efter nogle uger eventuelt opleve én eller flere af følgende bivirkninger:

- Hedeture/svedeture
- Træthed
- Kvalme

- Humørpåvirkning
- Manglende seksuel lystfølelse
- Impotens
- Muskelsvaghed
- Knogleafkalkning
- Brystkirtlerne kan blive ømme og vokse. For at forebygge det, vil du blive henvist til strålebehandling mod brysterne (1 behandling).
- Leverpåvirkning ses i sjældne tilfælde.

Når du kommer til kontrol, vil vi drøfte, om du er generet af eventuelle bivirkninger, og hvilke muligheder der er for at mindske dem.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Afsnit

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.30 – 15.00