



Når du har fået intravenøs kontrast ved CT-scanning (ambulante patienter)

I forbindelse med din undersøgelse i Billeddiagnostisk Afsnit har du fået kontrast i en blodåre. Kontrastvæsken kan hos nogle give lette bivirkninger såsom kvalme, opkastning, hudkløe og nældefeber. I sjældne tilfælde kan der opstå alvorlig allergisk reaktion, som kan være behandlingskrævende. Dette sker for det meste inden for ½ time efter undersøgelsen.

Vi opfordrer dig til at drikke rigeligt, hvis du har fået kontrastvæske.

BLIV PÅ HOSPITALET

Vi anbefaler, at du opholder dig på hospitalet 30 minutter efter undersøgelsen. Hvis du i denne periode føler ubehag, skal du henvende dig til personalet i receptionen, som så vil kontakte plejepersonalet. De vil vurdere dine symptomer.

REAKTIONEN KAN VÆRE FORSINKET

I sjældne tilfælde kan der forekomme en reaktion efter nogle få timer og op til flere dage efter undersøgelsen. Det kan vise sig ved hævelse i ansigtet, specielt omkring øjnene, eller ved en hudreaktion med rødme og kløe på kroppen.

Kontakt egen læge eller Lægevagten

Hvis du oplever dette, skal du kontakte egen læge eller Lægevagten med henblik på eventuel behandling. Kontakt også Billeddiagnostisk Afsnit, så vi kan tage hensyn til din reaktion, hvis du en anden gang skal have lavet en undersøgelse med kontraststof.

Alvorlig allergisk reaktion

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme vejrtrækningsbesvær, som er behandlingskrævende. Hvis det sker, skal du kontakte 112 og oplyse, at du har fået kontrast i blodåren i forbindelse med en CT-scanning.

HVIS DU ER I BEHANDLING MED INTERLEUKIN II

Er du i behandling med Interleukin II, kan der gå op til 2 uger, inden der eventuelt kan komme en reaktion.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Billeddiagnostisk Afsnit
Frederikshavn**

Tlf. 97 64 21 38

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.15 – 14.30