



Udsivning af røntgenkontraststof til huden

Dato for undersøgelsen: _____

I forbindelse med indsprøjtning af røntgenkontrast i din blodåre, er der sket en udsivning af noget af denne kontrastvæske.

Man kan desværre ikke helt undgå denne situation, selvom vi bestræber os på at gøre risikoen så lille som mulig.

UDSIVNING GIVER IKKE SKADE

Det er aldrig påvist, at udsivning af røntgenkontrast i underhuden giver skade på huden eller andre områder. Det er en lokal gene, i form af en smerte, hævelse og rødme.

Mindsk smerterne

Hvis du har brug for det, kan du mindske smerterne med smertestillende håndkøbsmedicin.

Derudover kan du ved store hævelser holde armen opad og eventuelt behandle med kolde omslag. Pak en pose frosne ærter eller is ind i et håndklæde. Du må aldrig bruge is eller lignende direkte på huden.

HVIS DU OPLEVER FORVÆRRING

Kontakt egen læge eller Lægevagten

Du skal hurtigst muligt søge lægehjælp og medbringe dette brev, hvis du skulle opleve en ændring af generne ved indstiksstedet, såsom:

- forværring af smerten
- at smerten flytter sig længere ud på armen
- at der kommer føleforstyrrelser ud i armen
- at der kommer store smerter, når du bevæger fingrene.

Personalet i Billeddiagnostisk Afsnit beklager de gener, du måtte få i forbindelse med din undersøgelse.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Billeddiagnostisk Afsnit
Frederikshavn**

Tlf. 97 64 21 38

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.15 – 14.30