



Forstørret nakkefold hos fosteret

Hvis en skanning af dit/jeres foster har vist, at det har forstørret nakkefold, betyder det ikke nødvendigvis, at fosteret er sygt. Der er dog en let øget risiko for sygdomme som fx hjertefejl, misdannelser, kromosomafvigelser og visse sjældne sygdomme.

Derfor tilbyder vi dig/jer yderligere undersøgelser af fosteret i form af en ultralydsskanning og eventuelt en moderkageprøve.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Nogle gravide, der får konstateret forstørret nakkefold hos fostret, bliver tilbudt en moderkageprøve eller fostervandsprøve for at udelukke Downs syndrom eller en anden genetisk afvigelse. Læs eventuelt pjecen "Moderkageprøve og fostervandsprøve". Som regel viser moderkageprøven, at kromosomerne eller generne er normale.

Uanset om du får taget en moderkage- eller fostervandsprøve eller ej, tilbyder vi, at du kan få en ekstra ultralydsskanning af fostrets hjerte samt en skanning for misdannelser.

Langt de fleste fostre med forstørret nakkefold er raske.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd

Tlf. 97 64 07 25

Telefontid: Mandag – fredag 8.00 – 11.00
og 13.30 – 14.30