



Kikkertundersøgelse af blæren

Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren, også kaldet en cystoskopi. Med undersøgelsen kan vi undersøge blærens slimhinde og samtidig kontrollere din blære for polypper, udposninger, fortykkelser, sår eller stendannelser.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du får lagt en lindrende gel i urinrøret. Herefter føres et tyndt kikkertrør (cystoskop) op i blæren, og blæren fyldes med lunkent, sterilt saltvand. Det gør, at vi bedre kan se den indvendige side af blæren.

Undersøgelsen varer 5-10 minutter, og du får så vidt muligt svar på undersøgelsen med det samme. Hvis vi sender urin- eller vævsprøver til yderligere undersøgelse, aftaler vi, hvordan du får svar på prøverne.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Tag et bad hjemmefra

Forbered dig hjemmefra ved at tage et bad. Af hygiejniske grunde er det vigtigt at være nyvasket inden undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent at have svie ved vandladningen efter undersøgelsen

Du kan have svie ved vandladning i op til 1 døgn efter undersøgelsen. Du kan også opleve blod i urinen. Det er helt normalt og skyldes, at kikkerten kan have lavet små rifter i dit urinrør.

Drik rigeligt efter undersøgelsen

Undersøgelse med instrumenter i urinvejene øger risikoen for, at du får blærebetændelse.

For at forebygge dette er det vigtigt, at du drikker rigeligt resten af døgnet. På den måde får du skyllet urinvejene godt igennem.

Hvis du får symptomer på blærebetændelse, skal du kontakte din egen læge. Tegn på blærebetændelse er feber, ildelugtende urin, svie og smerter ved vandladning og hyppige, små vandladninger.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Urinvejskirurgi

Sekretær

Tlf. 97 64 18 58

Vi træffes:

Mandag – fredag 9.00 – 12.00

Sygeplejerske

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes:

Mandag, onsdag, fredag 9.00 – 12.00