REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND
– i gode hænder

Operation af forstørret blærehalskirtel (skrælning)

Du skal have opereret din forstørrede blærehalskirtel.

Blærehalskirtlen (prostata) er en kirtel, som kun findes hos mænd. Den sidder lige under urinblæren, rundt om den øverste del af urinrøret. Prostata danner et sekret, som udgør en del af sæden.

Hos de fleste mænd vokser blærehalskirtlen med alderen. Hos nogle giver det besvær med at lade vandet. Denne tilstand kalder vi forstørret blærehalskirtel.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN

Bedøvelse under operationen
Operationen foregår i enten fuld bedøvelse eller i rygbedøvelse.

Inden du bliver bedøvet, får du anlagt et drop på håndryggen. Igennem dette får du væske og medicin.

Lægen, der skal operere, taler først med dig om, hvad der skal foregå, og herefter bliver du bedøvet.

Selve operationen
Under operationen fører lægen en kikkert (cystoskop) ind gennem urinrøret til blærehalskirtlen (prostata). Herigennem kan lægen med en elektrisk slynge skrælle væv af blærehalskirtlen, så passagen i urinlederen bliver større, og den forstørrede kirtel bliver mindre.
Efter operationen lægger vi et kateter op i blæren for at holde den tom for blod og urin, indtil du er vågen.

Operationen varer cirka 1 ½ time.

Efter operationen bliver du kørt til opvågningsstuen, hvor du bliver observeret, indtil du er vågen efter bedøvelsen. Herefter bliver du kørt tilbage til sengestuen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Forbered dig grundigt til operationen
Du har til samtalen inden operationen fået forklaret, hvordan du forbereder dig bedst muligt. Du har også fået udleveret en huskeseddel med titlen **'Husk, når du skal til operation'**, som beskriver dine forberedelser. Følg sedlen nøje – så har du det bedste udgangspunkt for operationen.

Urinundersøgelse
Når du ankommer til afdelingen, skal vi starte med at undersøge din urin for blærebetændelse. Det er derfor vigtigt, at du som anbefalet drikker 2 glas vand eller saft, 2 timer før du skal møde på afdelingen, så du kan lade vandet ved ankomsten.
Undlad at lade vandet, inden du har talt med en sygeplejerske.

EFTER OPERATIONEN

Hurtigt ud af sengen
Det er vigtigt, at du kommer i gang med at bevæge dig efter operationen. Det mindsker risikoen for komplikationer. Du skal derfor forvente, at vi allerede få timer efter operationen beder dig om at komme ud af sengen og gå rundt på stuen. Vi støtter dig selvfølgelig i det omfang, du har brug for det.

Kateter efter operationen
Det kateter, som vi har lagt op i blæren under operationen, skal du have, indtil det ikke bløder mere fra blæren. Det kan som regel fjernes cirka 4 timer efter operationen. Når vi har fjernet kateteret, og du kan lade vandet på acceptabel vis, kan du udskrives. Hvis du mod forventning skal beholde blærekateteret i længere tid, bliver du udskrevet med kateter. I så fald aftaler vi, hvornår du skal komme og få kateteret fjernet.

NÅR DU KOMMER HJEM

Sygemeld dig
Du må forvente at være sygemeldt i en periode efter operationen. Hvor længe du skal være sygemeldt, afhænger af den fysiske aktivitet i dit arbejde samt dit generelle helbred. Som regel er det nødvendigt at være sygemeldt i en uges tid efter denne behandling, men tal med lægen om netop dit behov.

Tag smertestillende efter behov
Du kan have lette smerter eller ubehag i den første tid efter operationen. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb (paracetamol).

Tag eventuelt antibiotika mod blærebetændelse
Hvis lægen vurderer, at du skal tage antibiotika mod blærebetændelse, får du udleveret tabletter, inden du bliver udskrevet.

Forebyg blærebetændelse
Der er altid en risiko for, at du kan få blærebetændelse, når du er blevet opereret i urinvejene.
Du kan forebygge blærebetændelse ved at drikke rigeligt med vand, så urinvejene bliver skyllet godt igennem.

Søg læge ved symptomer på blærebetændelse
Kontakt din læge, hvis du får ét eller flere af disse symptomer på blærebetændelse:

- Hyppig trang til vandladning
- Svie ved vandladning
- Feber.

Lægen vil undersøge din urin for bakterier. Det er vigtigt, at en eventuel blærebetændelse bliver behandlet.

Undgå hård fysisk aktivitet den første uge
Du bør tage den med ro den første uge efter operationen. Det vil sige, at du bør undgå hårdt fysisk arbejde, tunge løft, sex, løb og cykling den første uge efter operationen.
Brug eventuelt ble i en periode
Den første tid efter operationen kan din trang til at lade vandet være meget kraftig, og du kan have svært ved at holde på vandet. Det kaldes også urin-inkontinens. Det kan derfor være svært at nå på toilettet i tide, og måske er det nødvendigt at gå med en lille ble i en periode. Vedvarende urininkontinens efter en prostataoperation er sjælden.
Årsagen til dine vandladningsgener kan være irritation efter operationen. Symptomerne forsvinder oftest i løbet af 2-3 uger og varer sjældent ved.

Blodig urin efter operationen
Op til 3 måneder efter operationen kan urinen have en rødlig eller mørk farve, især i starten af vandladningen. Det kan se voldsomt ud, men det er ufarligt og går som regel over af sig selv. I den periode, hvor du oplever det, er det en god idé at drikke rigeligt med væske (gerne 2 liter om dagen), så urinvejene bliver skyllet godt igennem.

Forvent, at sædudløsningen kan være anderledes
Hos en del patienter vil operationen medføre, at de ikke længere får normal sædudløsning. Sæden løber i stedet op i blæren og tømmes ud ved næste vandladning. Det skyldes, at der omkring blærehalskirtlen er 2 lukkemuskler, og den øverste af disse lukkemuskler bliver fjernet ved operationen.

Der er ingen kontrol efter operationen
Du skal regne med, at der normalt går 3-4 måneder, inden det endelige resultat af operationen kan bedømmes. Hvis du har vandladningsproblemer herefter, skal du kontakte din egen læge.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Ambulatorium for Urinvejskirurgi
Sekretær
Tlf. 97 64 18 58
Vi træffes:
Mandag – fredag 9.00 – 12.00

Sygeplejerske
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes:
Mandag, onsdag, fredag 9.00 – 12.00