



Operation for svulst i blæren med Hexvix-medicin

Du skal have fjernet en svulst i blæren. Når vi har fjernet svulsten, sender vi den til undersøgelse for at finde ud af, om den er godartet eller ondartet.

I cirka halvdelen af tilfældene er svulsten godartet, og der er ikke behov for yderligere behandling. Viser svulsten sig at være ondartet, altså en kræftsvulst, tilbyder vi dig et behandlingsforløb.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN

En time inden operationen får du sprøjtet Hexvix-medicin op i blæren igennem et engangskateter i urinrøret. Det særlige ved Hexvix er, at kræftceller optager stoffet og bliver selvlysende i blått lys.

Bedøvelse under operationen

Selve operationen foregår i fuld bedøvelse eller i rygbedøvelse (spinalbedøvelse).

Inden du bliver bedøvet, får du lagt et drop på hånddryggen. Igennem dette får du væske og medicin under operationen.

Lægen, der skal operere, taler først med dig om, hvad der skal foregå, og herefter bliver du bedøvet.

Selve operationen

Operationen foretages gennem et tyndt kikkertrør (cystoskop) via urinrøret til blæren. Ved hjælp af blått lys kan lægen se forandringerne i blæren og fjerne dem.

Afhængig af hvor meget du bløder, får du eventuelt lagt et kateter i blæren. Kateteret tømmer blæren for blod. Du får fjernet kateteret nogle timer efter operationen.

I få tilfælde er det nødvendigt at beholde kateteret i en eller flere dage.

Operationen varer cirka 1 time.

Efter operationen bliver du kørt til opvågningsstuen, hvor du bliver observeret, indtil du er vågen efter

bedøvelsen. Herefter bliver du kørt tilbage på sengestuen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Forbered dig grundigt til operationen

Du har til samtalen inden operationen fået forklaret, hvordan du forbereder dig bedst muligt. Du har også fået udleveret en huskeseddel med titlen '**Husk, når du skal til operation**', som beskriver dine forberedelser. Følg sedlen nøje – så har du det bedste udgangspunkt for operationen.

Urinundersøgelse

Når du ankommer til afdelingen, skal vi starte med at undersøge din urin for blærebetændelse. Det er derfor vigtigt, at du som anbefalet drikker 2 glas vand eller saft, 2 timer før du skal møde på afdelingen, så du kan lade vandet ved ankomsten.

Undlad at lade vandet, inden du har talt med en sygeplejerske.

EFTER OPERATIONEN

Hurtigt ud af sengen

Det er vigtigt, at du efter operationen kommer i gang med at bevæge dig. Det mindsker risikoen for komplikationer. Du skal derfor forvente, at vi allerede få timer efter operationen beder dig om at komme ud af sengen og gå omkring. Vi støtter dig selvfølgelig i det omfang, du har brug for det.

Blodfortyndende medicin efter operationen

Der er risiko for komplikationer ved enhver operation. Ved denne operation er der risiko for blodprop i benene. For at mindske denne risiko får du en indsprøjtning med blodfortyndende medicin 4-6 timer efter operationen.



NÅR DU KOMMER HJEM

Sygemeld dig

Du må forvente at være sygemeldt i en periode efter operationen. Hvor længe du skal være sygemeldt, afhænger af den fysiske aktivitet i dit arbejde samt dit generelle helbred. Tal med lægen om netop dit behov.

Tag smertestillende efter behov

Du kan have lette smerter eller ubehag i den første tid efter operationen. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb (paracetamol).

Brug eventuelt ble i en periode

Den første tid efter operationen kan din trang til at lade vandet være meget kraftig, og du kan have svært ved at holde på vandet. Det kaldes urininkontinens.

Det kan derfor være svært at nå på toilettet i tide, og måske er det nødvendigt at gå med en lille ble i en periode. Årsagen til dine vandladningsgener kan være irritation efter operationen. Symptomerne forsvinder oftest i løbet af 2-3 uger og varer sjældent ved.

Forebyg blærebetændelse

Der er altid en risiko for, at du kan få blærebetændelse, når du er blevet opereret i urinvejene.

Du kan forebygge blærebetændelse ved at drikke rigeligt med væske, så urinvejene bliver skyllet godt igennem.

Søg læge ved symptomer på blærebetændelse

Kontakt din læge, hvis du får ét eller flere af disse symptomer på blærebetændelse:

- Hyppig trang til vandladning
- Svie ved vandladning
- Feber.

Lægen vil undersøge din urin for bakterier. Det er vigtigt, at en eventuel blærebetændelse bliver behandlet.

Undgå hård fysisk aktivitet

Du bør undgå hårdt fysisk arbejde, tunge løft og løb i den første uge efter operationen for at undgå blødninger fra blæren.

Forvent blod i urinen

De første uger efter operationen kan din urin have en rødlig eller mørk farve, især i starten af vandladningen. Det kan se voldsomt ud, men det er ufarligt og går som regel over af sig selv.

2-3 uger efter operationen afstødes de sårskorper, der bliver dannet i blæren efter operationen, og du vil opleve, at der i nogle dage er mere blod i urinen. I denne periode er det vigtigt, at du drikker rigeligt med væske, så urinvejene bliver skyllet godt igennem.

Få svar på undersøgelsen

Du får en tid til samtale i Urologisk Ambulatorium. Til samtalen får du svar på undersøgelsen af svulsten, og vi drøfter den videre kontrol eller et eventuelt behandlingsforløb med dig.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Urinvejskirurgi

Sekretær

Tlf. 97 64 18 58

Vi træffes:

Mandag – fredag 9.00 – 12.00

Sygeplejerske

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes:

Mandag, onsdag, fredag 9.00 – 12.00