



Behandling med Botox® i blæren

Du kan i samråd med en urolog vælge at blive behandlet med indsprøjtninger med Botox® i blæren. Når Botox® bliver indsprøjet i blærens slimhinde, vil blærens muskler bedre kunne slappe af.

Årsagerne til behandlinger med Botox® kan være vandladningsproblemer på grund af:

- overaktiv blære
- nerveskade i rygmarven (sklerose eller ulykkestilfælde).

Botox® vil virke ved at:

- reducere blærens sammentrækninger
- afslappe blæren, så den kan rumme en større mængde urin
- reducere omfanget af urinlækage
- reducere fornemmelsen af pludselig vandladningstrang
- reducere, hvor ofte du føler trang til at lade vandet
- give dig bedre kontrol over din vandladning.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Idet Botox® afslapper blæren i mere eller mindre grad, er det ikke sikkert, at du vil være i stand til at tømme blæren efter behandlingen. Det kan derfor blive nødvendigt for dig at anvende et engangskateter. Hvis du skal anvende et engangskateter, behøver du kun at tømme blæren hver 3.- 4. time på et tidspunkt, der passer dig.

Selve behandlingen

Du får lagt en lokalbedøvende gel op i dit urinrør. Når bedøvelsen virker, fører lægen et tyndt kikkertrør (cystoskop) op i blæren, hvorefter blæren bliver fyldt med lunkent sterilt saltvand. Det gør, at vi bedre kan se den indvendige side af blæren. Igennem cystoskopet indsprøjtes Botox i blærevæggen. Behandlingen varer 30-60 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Lav en urinprøve

Vi skal være sikre på, at du ikke har en urinvejsinfektion inden behandlingen. Du skal derfor gå til din egen læge med en urinprøve 1 uge inden behandlingen.

Vask dig grundigt

Vask dig grundigt i skridtet, inden du kommer til behandlingen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent at have gener ved vandladning

Det er normalt at have svie ved vandladning de første dage, ligesom det er normalt at have lidt blod i urinen i nogle dage. Du kan lindre eventuelle smerter med smertestillende medicin fra håndkøb (paracetamol).

Forebyg blærebetændelse

Der er altid en risiko for, at du kan få blærebetændelse.

Du kan forebygge dette ved at drikke rigeligt med vand, så urinvejene bliver skyllet godt igennem.

Ligeledes er det vigtigt, at du er omhyggelig med at tømme din blære regelmæssigt, enten ved naturlig vandladning eller ved brug af kateter.

Mangelfuld eller sjælden blæretømning giver større infektionsrisiko.

Afvent behandlingsens resultat

Du kan først vurdere det endelige resultat af behandlingen efter 7-14 dage.

Forny eventuelt behandlingen

Virkningen af behandlingen aftager gradvist, og efter cirka 6-8 måneder vil den blæreeafslappende virkning være ophørt. Er du interesseret i en ny behandling, skal du kontakte os for en ny samtale.

Ny Botox-behandling kan tidligst gives efter 4 måneder.



REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND
– i gode hænder

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Urinvejskirurgi

Sekretær

Tlf. 97 64 18 58

Vi træffes:

Mandag – fredag 9.00 – 12.00

Sygeplejerske

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes:

Mandag, onsdag, fredag 9.00 – 12.00