



Kikkertundersøgelse af tyktarmen (Udrensning med Picoprep® og Toilax®)

Du skal have lavet en kikkertundersøgelse af din tyktarm – også kaldet en koloskopi. Undersøgelsen kan afsløre eventuelle sygelige forandringer i tyktarmen.

Før undersøgelsen skal du udrenses med udrensningsmidlerne Picoprep® og Toilax®.

Sådan foregår undersøgelsen

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, som informerer dig om undersøgelsen og lægger en kanylen i en blodåre i din håndryg. Gennem kanylen i din hånd kan vi give dig beroligende eller smertestillende medicin, hvis du ønsker det. Medicinen lindrer ubehag og får dig til at blive afslappet og døsigt.

Du er vågen ved undersøgelsen og kan følge med på en tv-skærm.

Lægen benytter en bøjelig kikkert på tykkelse med en finger – et såkaldt koloskop. Koloskopet føres fra endetarmsåbningen op og rundt i tyktarmen. Der sidder et lille kamera for enden af slangen, som gengiver et billede af tarmens inderside på tv-skærmen. Gennem koloskopet kan lægen se tarmens slimhinde, tage vævsprøver og fjerne eventuelle polyper.

Det er nødvendigt at puste luft op i tarmen under undersøgelsen for at kunne se slimhinden. Det kan føles ubehageligt og give forbigående mavekneb, kvalme og oppustethed.

Undersøgelsen varer 30-60 minutter.

Vær opmærksom i god tid før undersøgelsen

Ring til os, før du udrenser, hvis du:

- **Har nedsat nyrefunktion.** Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du udrenses med et andet præparat, og efter en anden procedure, der kan tåles af nyrer med nedsat funktion. Ring til os for nærmere information.
- **Har diabetes, der er svært at regulere med medicin.** I det tilfælde vil vi forsøge at fremrykke din undersøgelse til så tidligt på dagen som muligt.
- **Hvis du har allergi overfor citrusfrugter.** Picoprep®, som du skal udrense med, indeholder citronsyre. Ring til os for nærmere information.



Tager du medicin, skal du være opmærksom på følgende:

- **Diabetesmedicin.** Har du diabetes, som behandles med tabletter, skal du vente med at tage medicinen til efter undersøgelsen. Medbring den i stedet. Har du diabetes, som behandles med insulin, skal du aftale med din egen læge, hvordan du skal tage insulin i forbindelse med undersøgelsen.
- **Blodfortyndende medicin.** Du skal fortsætte med din blodfortyndende medicin som vanligt. Hvis du tager et af disse præparater: Marcoumar, Marevan, Warfarin "Orion", Warfarinnatrium "2care4" skal du have taget **2 INR-blodprøver**. Den første tages **1 uge før** og den anden **dagen før** undersøgelsen. Begge skal tages hos din egen læge. Har du været hos os, og fået lagt en plan forud for undersøgelsen, skal du følge den. Har vi indkaldt dig mindre end 1 uge før undersøgelsen, skal du kun have taget den INR-blodprøve, som skal tages dagen før.
- **Anden vanlig medicin.** Fortsæt med din vanlige medicin under udrensning. På undersøgelsesdagen skal du tage din vanlige morgenmedicin med lidt vand om morgenen, senest 2 timer før mødetid.

Udrensningsmidlerne Picoprep® og Toilax® kan have indflydelse på andre lægemidler.

Forvent utilpashed og ømhed ved udrensningen

Det er normalt, at der i forbindelse med udrensningen kan komme forbigående kvalme, mavekneb og utilpashed. Mange oplever irritation og ømhed ved tarm-åbningen i forbindelse med udrensningen. Du kan eventuelt smøre tarmåbningen med en god, fed creme flere gange dagligt for at undgå ømhed.

Hvis du har stomi, er det en god idé at benytte en tømbar pose under udrensningen.

Sådan skal du udrense før undersøgelsen

For at vi kan undersøge tarmen indvendigt, er det nødvendigt, at den er tom. Du skal derfor spise på en bestemt måde i dagene op til undersøgelsen samt udrense tarmen med udrensningsmidlet Picoprep® og tablet Toilax®, som du skal hente på apoteket. **Husk at medbringe din rekvisition.**

NB ved indlæggelse: Hvis du skal indlægges dagen før undersøgelsen, skal du ikke hente Picoprep®, men udelukkende 4 tabletter Toilax®, som du skal tage hjemme. Udrensningen foregår derefter på hospitalet.

Følg vores vejledning herunder nøje – Følg ikke vejledningen fra udrensningspakken.



Ugen før

Tidspunkt	Forberedelse
7 dage før (eller tidligst muligt)	Tag ikke jerntabletter – tager du normalt jerntabletter, så hold en pause med dem, indtil undersøgelsen er ovre.
5 dage før	Spis kun kernefri kost frem til undersøgelsen – det vil sige, at du ikke må spise brød med kerner, kiwifrugt, hørfrø, sesamfrø, birkens med videre.

2 dage før

Tidspunkt	Forberedelse
Hele dagen	Drik rigeligt hver dag frem til undersøgelsen – det vil sige 2-3 liter dagligt.
18.00	Tag 2 tabletter Toilax® – du kan forvente virkning efter 6- 12 timer.

Dagen før

Tidspunkt	Forberedelse
Hele dagen	Spis kun flydende kost – alt, der kan passere gennem en si. Drik rigeligt – det vil sige 2-3 liter. Drik gerne vand, sodavand, juice uden frugtkød, kaffe, te, ernæringsdrikke, klar og legeret suppe, bouillon og saftvand (undtagen solbær- og blåbærsaft).
8.00	Tag 2 tabletter Toilax®.
16.00	Tag Picoprep®. Opløs den første pose Picoprep® udrensningspulver i 1½ dl vand. Du kan forvente virkning i løbet af 1-3 timer. Drik herefter yderligere 1-1½ liter flydende kost eller væske i løbet af de næste 1-4 timer. Hvis du har stomi, er det en god idé at benytte en tømbar pose under udrensningen.
22.00	Tag Picoprep®. Opløs den anden pose Picoprep®-udrensningspulver i 1½ dl vand. Drik herefter yderligere 1-1½ liter flydende kost eller væske i løbet af de næste 1-4 timer.



På undersøgelsesdagen

Tidspunkt	Forberedelse
6 timer før mødetid	Stop med at spise – du må kun drikke klare væsker, fx te, kaffe uden mælkeprodukter, æblejuice, saft og vand. Du må ikke drikke mælkeprodukter.
2 timer før mødetid	Vær fastende – det vil sige, at du hverken må indtage mad eller drikke.

Sådan laver du en Picoprep®-blanding

- Åbn et brev Picoprep®.
- Tag et glas med 1½ dl koldt vand.
- Hæld pulveret fra brevet i vandet.
- Rør blandingen i 2-3 minutter. Når det ikke længere bruser, er blandingen færdig. Blandingens skal være uklar/råhvid. Drik blandingen over cirka 15 minutter.

Efter undersøgelsen

Har du fået medicin under undersøgelsen, skal du observeres 1/2 time, hvor du har mulighed for at hvile dig, inden du tager hjem. Har du brug for mad og drikke, skal du selv medbringe dette.

Det er normalt, at der efter undersøgelsen kan være forbigående mavekneb, kvalme og oppustethed.

Aftal at blive hentet af en pårørende

Efter undersøgelsen må du tage hjem, når du selv synes, du er klar til det. Hvis du har fået beroligende og/eller smertestillende medicin, må du ikke selv køre hjem. Aftal derfor at have en pårørende til at hente dig, da du ikke må køre bil eller betjene farlige maskiner de følgende 24 timer.

Svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen inden du tager hjem.

Hvis der under undersøgelsen er taget vævsprøver fra din tarm, går der 3-6 uger, før svaret er klar. Du får enten svar i din Digital Post, per brev eller i vores ambulatorium.

Din praktiserende læge får automatisk besked om undersøgelsen, medmindre du ikke ønsker det.



Når du kommer hjem

Ved mistanke om komplikationer

Koloskopi er en meget sikker undersøgelse. I meget sjældne tilfælde kan der dog optræde komplikationer. Det kan dreje sig om bivirkninger ved udrensningen eller den beroligende og smertestillende medicin, blødning eller hul i tarmens væg, hvis der er taget vævsprøver.

Hvis du oplever vedvarende mavesmerter, kraftig blødning eller bliver utilpas efter undersøgelsen, skal du kontakte egen læge eller vagtlæge.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om kikkertundersøgelse af tyktarmen, kan du eventuelt læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'koloskopi'.



Ambulatorium for Endoskopi, Hjørring

Tlf. 97 64 29 65

Vi træffes: Mandag – fredag 8.30 – 12.00