



Kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi)

Til patienter som skal bedøves

Udrensning med Picoprep® og Toilax®

Du skal have lavet en kikkertundersøgelse af din tyktarm – også kaldet en koloskopi. Undersøgelsen kan afsløre eventuelle sygelige forandringer i tyktarmen.

Før undersøgelsen skal du udrenses med udrensningsmidlerne Picoprep® og Toilax®.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, som informerer dig om undersøgelsen. Undersøgelsen foregår i fuld bedøvelse eller i en dyb rus.

Lægen benytter en bøjelig kikkert på tykkelse med en finger – et såkaldt koloskop. Koloskopet føres fra endetarmsåbningen op og rundt i tyktarmen. Der sidder et lille kamera for enden af slangen, som gengiver et billede af tarmens inderside på tv-skærmen. Gennem koloskopet kan lægen se tarmens slimhinde, tage vævsprøver og fjerne eventuelle polyper.

Undersøgelsen varer 30-60 minutter.

VÆR OPMÆRKSOM I GOD TID FØR UNDERSØGELSEN

Ring til os, før du udrenser, hvis du:

- **Har nedsat nyrefunktion.** Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du udrenses med et andet præparat, og efter en anden procedure, der kan tåles af nyrer med nedsat funktion. Ring til os for nærmere information.
- **Har diabetes, der er svært at regulere med medicin.** I det tilfælde vil vi forsøge at fremrykke din undersøgelse til så tidligt på dagen som muligt.
- **Hvis du har allergi overfor citrusfrugter.** Picoprep®, som du skal udrense med, indeholder citronsyre. Ring til os for nærmere information.

VÆR OPMÆRKSOM HVIS DU TAGER MEDICIN

Anden vanlig medicin

Fortsæt med din vanlige medicin under udrensning. På undersøgelsesdagen skal du tage den medicin, som du har aftalt med anæstesilægen.

Tag medicinen med lidt vand om morgenen, senest 2 timer før mødetid.

Følg nedenstående retningslinjer vedrørende specifik medicin

- **Diabetes.** Har du diabetes, der behandles med tabletter, skal du vente med at tage medicinen til efter undersøgelsen. Medbring den i stedet. Har du diabetes, som behandles med insulin, er der med anæstesilægen aftalt plan for, hvordan du skal tage insulin på undersøgelsesdagen.
- **Blodfortyndende medicin.** Du skal fortsætte med din blodfortyndende medicin som vanligt. Hvis du tager blodfortyndende medicin, som er et af de nedenstående præparater: Marcoumar, Marevan, Warfarin, "Orion" Warfarinnatrium "2care4", skal du have taget en INR-blodprøve hos din egen læge dagen før undersøgelsen. Har du været hos os, og fået lagt en plan forud for undersøgelsen, skal du følge den.

Udrensningsmidlerne Picoprep® og Toilax® kan have indflydelse på andre lægemidler.

Forvent utilpashed og ømhed ved udrensningen

Det er normalt, at der i forbindelse med udrensningen kan komme forbigående kvalme, mavekneb og utilpashed. Mange oplever irritation og ømhed ved tarm-åbningen i forbindelse med udrensningen. Du kan eventuelt smøre tarmåbningen med en god, fed creme flere gange dagligt for at undgå ømhed.

Hvis du har stomi, er det en god idé at benytte en tømbar pose under udrensningen.



SÅDAN SKAL DU UDRENSE FØR UNDERSØGELSEN

For at vi kan undersøge tarmen indvendigt, er det nødvendigt, at den er tom. Du skal derfor spise på en bestemt måde i dagene op til undersøgelsen samt udrense tarmen med udrensningsmidlet Picoprep® og tablet Toilax®, som du skal hente på apoteket.
Husk at medbringe din rekvisition.

NB ved indlæggelse: Hvis du skal indlægges dagen før undersøgelsen, skal du ikke hente Picoprep®, men udelukkende 4 tabletter Toilax®, som du skal tage hjemme. Udrensningen foregår derefter på hospitalet.

Sådan laver du en Picoprep®-blanding

- Åbn et brev Picoprep®.
- Tag et glas med 1½ dl koldt vand.
- Hæld pulveret fra brevet i vandet.
- Rør blandingen i 2-3 minutter. Når det ikke længere bruser, er blandingen færdig. Blandingens skal være uklar/råhvid. Drik blandingen over cirka 15 minutter.

Følg vores vejledning herunder nøje – Følg ikke vejledningen fra udrensningspakken.

UGEN FØR

7 dage før (eller tidligst muligt)	Tag ikke jerntabletter Tager du normalt jerntabletter, så hold en pause med dem, indtil undersøgelsen er ovre.
5 dage før	Spis kun kernefri kost frem til undersøgelsen Det vil sige, at du ikke må spise brød med kerner, kiwifrugt, hørfrø, sesamfrø, birkes med videre.
2 dage før	Undgå mælkeprodukter frem til undersøgelsen

Drik rigeligt hver dag frem til undersøgelsen

Det vil sige 2-3 liter dagligt.

Klokken 18.00

Tag Toilax®

Tag 2 tabletter Toilax®
Du kan forvente virkning efter 6- 12 timer.

DAGEN FØR

Spis kun flydende kost

Alt, der kan passere gennem en si.

Drik rigeligt

Det vil sige 2-3 liter.
Drik gerne vand, sodavand, juice uden frugtkød, kaffe, te, ernæringsdrikke, klar og legeret suppe, bouillon og saftvand (undtagen solbær- og blåbærsaft).

Klokken 08.00

Tag Toilax®

Tag 2 tabletter Toilax®

Klokken 16.00

Tag Picoprep®

Opløs den første pose Picoprep® udrensningspulver i 1½ dl vand.

Du kan forvente virkning i løbet af 1-3 timer.

Drik herefter yderligere 1-1½ liter flydende kost eller væske i løbet af de næste 1-4 timer.

Hvis du har stomi, er det en god idé at benytte en tømbar pose under udrensningen.

Klokken 22.00

Tag Picoprep®

Opløs den anden pose Picoprep®-udrensningspulver i 1½ dl vand.

Drik herefter yderligere 1-1½ liter flydende kost eller væske i løbet af de næste 1-4 timer.



PÅ UNDERSØGELSESDAGEN

6 timer før mødetid

Stop med at spise.

Du må kun drikke klare væsker, fx te, kaffe uden mælk, æblejuice, saft og vand.

2 timer før mødetid

Vær fastende

Det vil sige, at du hverken må indtage mad eller drikke.

NÅR DU KOMMER HJEM

Ved mistanke om komplikationer

Koloskopi er en meget sikker undersøgelse. I meget sjældne tilfælde kan der dog optræde komplikationer. Det kan dreje sig om bivirkninger ved udrensningen eller den beroligende og smertestillende medicin, blødning eller hul i tarmens væg, hvis der er taget vævsprøver.

Hvis du oplever vedvarende mavesmerter, kraftig blødning eller bliver utilpas efter undersøgelsen, skal du kontakte egen læge eller vagtlæge.

EFTER UNDERSØGELSEN

Når du har været fuldt bedøvet, bliver du kørt til opvågningsstuen, hvor du bliver observeret, indtil du er vågen efter bedøvelsen. Herefter bliver du kørt tilbage til sengestuen.

Hvis undersøgelsen er foregået i dyb rus, bliver du kørt tilbage til sengestuen umiddelbart efter undersøgelsen.

Aftal at blive hentet af en pårørende

Da du har været bedøvet, må du ikke selv køre hjem. Aftal derfor at have en pårørende til at hente dig. Du må ikke køre bil eller betjene farlige maskiner de følgende 24 timer.

Af hensyn til transport kan det være rart at vide, at det er normalt, at der efter undersøgelsen kan være forbigående mavekneb, kvalme og oppustethed.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du får svar på undersøgelsen inden du tager hjem.

Hvis der under undersøgelsen er taget vævsprøver fra din tarm, går der 3-6 uger, før svaret er klar. Du får enten svar i din e-Boks, per brev eller i vores ambulatorium.

Din praktiserende læge får automatisk besked om undersøgelsen, medmindre du ikke ønsker det.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om kikkertundersøgelse af tyktarmen, kan du eventuelt læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'koloskopi'.



Kontakt

Ambulatorium for Endoskopi, Hjørring

Tlf. 97 64 29 65

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 08.30 – 14.00