



Behandling af rytmeforstyrrelser i hjertet med amiodaron

Du skal i behandling med amiodaron, der er et indholdsstof, som anvendes til at behandle rytmeforstyrrelser i hjertet.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Amiodaron virker ved at hæmme de elektriske impulser i hjertemuskulaturen, så hjertets rytme normaliseres. Formålet med behandlingen er at holde din hjerterytm normal, så du kan undgå de gener, som en uregelmæssig hjerterytm kan give.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Det er forskelligt fra person til person, hvor meget amiodaron man skal have for at holde hjerterytm regelmæssig.

I de første uger får du en høj dosis. Herefter vil din døgndosis ligge mellem 100 og 400 mg.

MULIGE BIVIRKNINGER

Påvirkning af organer

Som ved al anden medicin er der risiko for at få bivirkninger af behandlingen. Amiodaron kan påvirke skjoldbruskkirtel (stofskifte), lever og lunger. Derfor kontrollerer vi løbende behandlingen med blodprøver og røntgenundersøgelse.

Øget lysfølsomhed

Amiodaron medfører øget lysfølsomhed. Du skal derfor være varsom med at opholde dig i sollys. Brug solcreme med minimum faktor 30, når du er i solen, og beskyt altid din krop og særligt dit ansigt, dine arme og hænder mod direkte sollys.

KONTROL

Senest 1 uge før kontrolbesøget skal du have taget blodprøver og eventuelt røntgenbilleder af hjerte og lunger, så vi har svar på disse undersøgelser, når du kommer til kontrol.

Vi bestiller blodprøverne, og du kan få dem taget hos din egen læge. Du får tilsendt en tid til røntgen.

Efter det første år skal du kun til kontrol cirka hvert halve år. Du skal have taget blodprøver forud for hver kontrol og røntgenbilleder af hjerte og lunger forud for hver anden kontrol.

Ved hver kontrol taler du med enten en læge eller en sygeplejerske. Du får målt blodtryk og taget hjertediagram. Ud fra undersøgelserne vurderer vi, om behandlingen har den ønskede effekt.

Medbring altid en liste over din medicin, når du skal til kontrol.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os, hvis du mangler medicin

Amiodaron må kun ordineres af en hjertespecialist. Du får derfor udleveret en recept fra gang til gang, når du kommer til kontrol. Kommer du til at mangle tabletter, skal du kontakte ambulatoriet.

Undgå grapefrugtjuice

Undgå grapefrugtjuice, da denne juice nedsætter effekten af amiodaron. Du må gerne spise grapefrugter.

Få kontrolleret INR, hvis du får Marevan® eller Marcoumar®

Hvis du har været i behandling med Marevan® eller Marcoumar®, før du er startet med amiodaron, skal du være opmærksom på, at amiodaron kan øge effekten af Marevan® og Marcoumar®. Du bør derfor få kontrolleret din INR hos din egen læge lidt oftere end vanligt i starten af behandlingen med amiodaron.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Hjertemedicinsk Afsnit

Tlf. 97 64 08 39

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.00 – 19.00