REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND
– i gode hænder

Provokationstest ved mistænkt medicinallergi

Du skal have lavet en såkaldt provokationstest, fordi der er mistanke om, at du har allergi over for medicin. Testen laves, hvis du tidligere har haft allergiske symptomer i forbindelse med brug af medicin.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN:

Inden undersøgelsen begynder, gennemgår en sygeplejerske, om oplysningerne om din nuværende medicin stadig er rigtige. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, spørger vi dig, om du er gravid. Så får du kontrolleret puls, blodtryk og lungefunktion. Du får lagt en lille plastikslange (venflon) i en blodåre på håndryggen.

Den medicin, du skal undersøges for allergi over for, gives enten som opløsning/tablet eller som indsprøjtning. Det afhænger af, hvilket lægemiddel du skal undersøges for.

Du får først en meget lille mængde medicin, hvorefter dosis øges med ½ times interval til fuld dosis.
Efter hver dosis måler vi puls, blodtryk og lungefunktion og spørger til, hvordan du har det. Hvis der ikke har været nogen reaktion 2 timer efter sidste dosis, afslutter vi undersøgelsen.

Undersøgelsen varer 5-6 timer.

Der vil altid være en sygeplejerske i nærheden, som du skal give besked, hvis du får tegn på allergisk reaktion.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Undlad visse typer medicin
Undlad at tage allergimedicin i form af antihistaminer (også håndkøb) i 3 døgn før testen. Visse typer blodtryksmedicin må ikke tages 1-3 døgn før testen. Vi kontakter dig, hvis vi kan se, at du får denne type medicin.

Giv os besked, hvis du får antibiotika
Får du behandling med antibiotika, skal der gå mindst 3 uger, fra behandlingen er ophørt, og til du laver prøven. Ring derfor til os, hvis du kommer i behandling med antibiotika op til prøven.

Medbring gerne underholdning
Medbring gerne læsestof, håndarbejde, computer eller lignende, så du kan få tiden til at gå i de 5-6 timer, undersøgelsen varer.

Kontakt os forud for undersøgelsen, hvis du:

- får binyrebarkhormon (Prednisolon)
- har påbegyndt ny medicin, efter du er blevet henvist til undersøgelsen
- er i tvivl om fx håndkøbsmedicin
- er gravid.

NÅR DU KOMMER HJEM

Hvis der opstår tegn på allergisk reaktion, skal du kontakte os førstkommende hverdag.
Hvis du får en kraftig reaktion, som kræver akut behandling, skal du selvfølgelig kontakte Lægevagten.

I nogle tilfælde skal du fortsætte med tabletbehandling derhjemme i 1 uge, så vi kan se, om du får en senreaktion i form af hududslæt. Hvis du skal fortsætte med at tage medicin derhjemme, får du nærmere information i forbindelse med undersøgelsen.

Hvis vi ikke har hørt fra dig efter 3 uger, går vi ud fra, at du ikke fik nogen reaktion på medicinen.
Din praktiserende læge får besked om undersøgelsens resultat.

...fortsættes

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Lungemedicinsk Ambulatorium
Tlf. 97 64 08 21
Vi træffes:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00