



Udtømning af væske fra lungehulen (pleuracentese)

Du har fået konstateret væske i lungehulen. Lungehulen er det lille hulrum, der findes mellem indersiden af brystvæggen og lungen.

Du skal have tømt væsken ud. En tapning af væsken kaldes også for pleuracentese eller pleurapunktur. Lægen beslutter, om det skal foregå under indlæggelse eller ambulantly.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Inden vi tømmer væsken ud af pleurahulen, bliver du ultralydsskannet på ryggen, så vi helt præcist kan se, hvor væsken ligger. Du skal have din trøje af, mens vi skanner dig.

Herefter bliver du lokalbedøvet med en indsprøjtning i området. Når bedøvelsen virker, foretager vi et indstik imellem ribbenene og videre ind til væsken, som vi herefter tømmer ud via en tynd slange (et dræn). Selve anlæggelsen af drænet tager cirka 15 minutter.

Det er individuelt, hvor lang tid udtømningen tager. Det afhænger helt af, hvor meget væske der er i pleurahulen. Ved ambulantly behandling fjernes drænet umiddelbart efter udtømning.

Hvis vi ikke kender årsagen til, at du danner væske, sender vi væsken til nærmere undersøgelse.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Hold pause med blodfortyndende medicin

Får du blodfortyndende medicin, skal du eventuelt holde pause før undersøgelsen. Følg de instrukser, du har fået af lægen.

Du må gerne fortsætte med at tage Hjertemagnyl®. Inden undersøgelsen har du også fået taget blodprøver for at undersøge, om der er risiko for blødning.

EFTER BEHANDLINGEN

Du får smertestillende medicin efter behov

De fleste patienter har ikke gener efter pleuracentesen. Du kan dog være øm omkring det sted, hvor vi har stukket drænet ind. Ved behov får du smertestillende medicin. Det er meget vigtigt, at du fortsat bevæger dig og klarer almindelige daglige gøremål.

Udtømningen medfører en lille risiko for, at lungen falder lidt sammen. Hvis du får åndenød eller smerter, tager vi et kontrolrøntgenbillede af dine lunger. Et sammenfald af lungen kan medføre yderligere et par dages indlæggelse.

I visse tilfælde, hvor vi ikke kender årsagen til, at du danner væske, skal du have lavet en røntgen-skanning (CT-skanning) af dine lunger, når vi har tømt væsken ud.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN AF VÆSKE

Lungemedicinsk Sengeafsnit eller Lungemedicinsk Ambulatorium giver dig besked om, hvordan du får svar.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personalet.



Kontakt

Lungemedicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 64 08 21

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Lungemedicinsk Sengeafsnit 204B

Tlf. 97 64 09 17