



# Lang provokationstest ved mistænkt medicinallergi

Du er i gang med en såkaldt provokationstest, fordi der er mistanke om, at du har allergi over for medicin. Der har ikke været nogen tegn på akut allergisk reaktion i forbindelse med testen her i ambulatoriet. Det er rigtig godt, for de reaktioner, der kan være farlige, er dem, der kommer lige efter, at den første fulde medicindosis er givet.

En normal undersøgelse udelukker dog ikke, at du kan udvikle hududslæt efter længere tids behandling. Det vil vi gerne undersøge dig for. Derfor skal du tage en medicinkur efter dit besøg.

## SÅDAN TAGER DU MEDICINKUREN

Du får medicin med herfra.

Præparat: \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ tabletter \_\_\_\_\_ gange i \_\_\_\_\_ dage.

## NÅR DU KOMMER HJEM

### Fotografér eventuelt udslæt

Hvis der kommer tegn på allergisk reaktion, vil vi gerne have besked.

En allergisk reaktion vil stort set altid vise sig ved et hududslæt. Derfor vil vi bede dig om at fotografere hududslættet og sende billedet til os.

### Brug sikker mail

Da der er tale om fortrolige oplysninger, er det vigtigt, at du bruger en sikker mail-forbindelse.

Du kan sende sikker e-mail til os ved at gå ind på hospitalets hjemmeside [www.rhnordjylland.rn.dk](http://www.rhnordjylland.rn.dk) og finde Ambulatorium for Lungemedicin (søg fx på 'Ambulatorium for Lungemedicin'). Øverst til højre på siden finder du et link, som du kan trykke på for at sende en sikker mail til os. Login med dit NemID.

### Kontakt Lægevagten ved en kraftig reaktion

Hvis du får en kraftig reaktion, som kræver akut behandling, skal du kontakte Lægevagten.

Hvis vi ikke har hørt fra dig efter 3 uger, så går vi ud fra, at du ikke fik nogen reaktion på medicinen.

Din praktiserende læge får besked om undersøgelses resultat.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Lungemedicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 64 08 21

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00