



Øjenprovokationstest

Du skal have undersøgt en allergisk reaktion i dit øje.

Målet med undersøgelsen er at finde ud af, om det er et specifikt allergen -- altså et stof, man kan være allergisk overfor -- der fremkalder overfølsomhedsreaktionerne hos dig. Med den viden vil vi mere præcist kunne vurdere, om du vil have effekt af behandling for allergenet.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Ved undersøgelsen drypper vi dine øjne med det allergen, som vi mistænker giver dig en allergisk reaktion. Øjnene dryppes med forskellige doser, og vi observerer øjnene i 10 minutter efter hver dosis.

Hvis der opstår en positiv reaktion, vil der ses øjenkløe, tåreflåd, rødme og hævelse. Hos enkelte kan der også opstå høfebersymptomer. Symptomerne forsvinder igen efter kort tid. Herefter vil du eventuelt kunne tage antihistamin.

Undersøgelsen varer cirka 45 minutter.

Viser det sig, at du reagerer positivt på undersøgelsen – og altså har en overfølsomhedsreaktion fra allergenet – tager du sammen med lægen stilling til, om du har brug for behandling.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Hold pause med medicin før undersøgelsen

For at vi kan få et retvisende resultat af undersøgelsen, skal du holde pause med medicin:

- **Antihistamin** – allergitabletter/næsespray. Hold pause med dette **fra 3 dage** før undersøgelsen.
- **Øjendråber**. Brug ikke øjendråber **fra 24 timer** før undersøgelsen.

Kontakt os, hvis du har øjenbetændelse

Har du øjenbetændelse på undersøgelsesdagen, skal du kontakte os for en ny tid. Vi kan ikke undersøge dig, mens du har øjenbetændelse.

Undlad at bruge kontaktlinser

Vi vil gerne undersøge dit øje, uden at det har været påvirket af kontaktlinser samme dag. Undlad ligeledes at benytte kontaktlinser resten af dagen, så længe du eventuelt har symptomer.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Lungemedicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 64 08 21

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00