



Selvbehandlingsplan

Oplever du en forværring i din åndenød, får du tiltagende hoste og tiltagende mængde opspyt, er der behov for, at du starter ekstra behandling, ud over den du vanligt får. Du skal derfor tage den medicin, som vi har beskrevet nedenfor.

Hvis vi har aftalt, at du skal indsende en prøve af opspyt, skal du gøre det, før du starter på medicin fra selvbehandlingsplanen.

Kontakt din læge

Forværres dine symptomer, efter du er startet med at tage medicinen, skal du kontakte din læge. Det gælder også, hvis du ikke har fået det bedre, når du har taget medicinen i 2 døgn.

Vi ringer, hvis der er ændringer

Efter vi har analyseret den opspytprøve, du sender til os, kontakter vi dig, hvis der er behov for at ændre i

den behandling, som er beskrevet her. Er der ikke behov for at ændre behandlingen, hører du ikke fra os. Så fortsætter du bare med at tage medicinen som beskrevet.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Lungemedicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 64 08 21

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00

BEHANDLINGSPLAN

Amoxicillin á 500 mg. 1 stk. 3 gange dagligt i: _____ dage

Bioclacid á 500 + 125 mg 1 stk. 3 gange dagligt i: _____ dage

Prednisolon á 25 mg. 1½ stk. 1 gang dagligt i: _____ dage