REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND
– i gode hænder

Tømning af cyste i leveren

Du har en eller flere cyster i leveren, som giver dig smerter. For at afhjælpe smerterne skal du have tømt cysterne for væske.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Før behandlingen vil sygeplejersken måle dit blodtryk og din puls samt eventuelt tage en blodprøve.

Selve behandlingen foregår i Røntgenafdelingen.

Under behandlingen er du lokalbedøvet i huden over leveren. Du bliver ultralydsskannet, så lægen kan se, hvor cysten sidder. Mens du bliver ultralydsskannet, fører lægen en kanyle ind i cysten og tømmer den for væske.

Behandlingens varighed afhænger af, hvor mange cyster der skal tømmes.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vær opmærksom på medicin

- Får du insulin, skal du undlade at tage din morgenmedicin. Medbring din insulin til undersøgelsen, og tag halv morgendosis efter undersøgelsen i forbindelse med det første måltid mad.
- Får du tabletbehandling mod sukkersyge, skal du tage din medicin, som du plejer.
- Lægen, der har besluttet, at du skal have tømt cyster, skal gerne have taget stilling til, om du skal holde pause med blodfortyndende medicin inden behandlingen. Hvis du ikke har fået besked herom, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsesdagen med henblik på regulering af den blodfortyndende medicin.
- Får du Plavix® (clopidogrel) eller Hjertemagnyl®, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsen med henblik på, om du skal holde pause med denne medicin.
- Får du anden medicin, må du tage den med lidt vand om morgenen.

Mød fastende til aftalen
Du skal faste inden behandlingen, så din mavesæk er helt tom. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra midnat inden behandlingen. Du må heller ikke drikke eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må tage medicin i henhold til ovenstående retningslinjer.

Bestil tid til en blodprøve inden aftalen
Vi skal bruge en blodprøve fra dig 1-2 dage inden aftalen. Blodprøven kan kun tages på et sygehus i Region Nordjylland.

EFTER BEHANDLINGEN

Vær fastende i 2 timer
Efter behandlingen skal du faste i 2 timer.

Bliv i sengen i 1 time
Du skal blive i sengen i 1 time. Du får målt blodtryk, puls og vejrtrækning regelmæssigt i den periode.

Tag hjem
Når der er gået 1 time uden tegn på komplikationer, må du tage hjem, men du bør ikke køre bil selv.

KOMPLIKATIONER

Efter behandlingen kan du have lette smerter, som vi kan behandle med et smertestillende middel.

Bliver du svimmel, utilpas eller får smerter, efter du er kommet hjem, skal du kontakte Medicinsk Gastroenterologisk Sengeafsnit.

Meget sjældent (1-3 ud af 1000 behandlinger) kan der forekomme blødning eller alkoholudsivning i bughulen, men det kræver sædvanligvis ikke nogen særlig behandling.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00