



Kikkertundersøgelse af maven

Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af maven, en såkaldt gastroskopi. Formålet med undersøgelsen er at se, om du har forandringer i spiserør, mavesæk og tolvfingertarm, som kan forklare dine symptomer.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du har mulighed for at få beroligende medicin, inden undersøgelsen begynder.

Lægen undersøger din mave med en blød, bøjelig slange, kaldet et gastroskop, der føres ind gennem din mund. Slangen er smurt med bedøvende creme. For at beskytte slangen får du en bidering i munden, og derfor skal du på forhånd oplyse os om eventuelle tandproblemer.

Du skal ligge på venstre side under behandlingen. Lægen fører slangen gennem spiserøret, ud i mavesækken og videre til tolvfingertarmen. Hvis der er forandringer, kan lægen tage vævsprøver til nærmere undersøgelse.

Behandlingen varer cirka 10-20 minutter.

Hvis du er indlagt, kommer du tilbage til dit sengeafsnit, når undersøgelsen er slut. Hvis du er til ambulant undersøgelse, får du tilbudt et lille måltid mad, inden du tager hjem. Har du fået beroligende medicin, skal du hvile i mindst 1 time på observationsstuen, før du tager hjem. Aftal eventuelt at have en pårørende til at hente dig, da du ikke må føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner før næste dag, hvis du har fået beroligende medicin.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til behandlingen

Du skal faste inden behandlingen, så din mavesæk er helt tom. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise eller drikke fra 6 timer inden aftalen. Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.

Undlad at ryge

Du må ikke ryge de sidste 6 timer før behandlingen.

Vær opmærksom, hvis du tager medicin

- Får du insulin, må du ikke tage din morgeninsulin. Efter undersøgelsen får du et måltid mad. Medbring din insulin, så du kan tage halv morgendosis i forbindelse med måltidet.
- Har du sukkersyge, som bliver behandlet med tabletter, skal du tage din medicin, som du plejer.
- Får du blodfortyndende medicin, skal du kontakte sekretæren, da du skal have kontrolleret blodfortyndingen 3-4 dage før undersøgelsen.
- Får du anden medicin, må du gerne tage den om morgenen med lidt vand til.

NÅR DU KOMMER HJEM

Afvent svar på undersøgelsen

Du får med det samme svar på, hvad lægen har set ved undersøgelsen. Hvis der er taget vævsprøver, vil der gå 10-12 dage, før svaret på undersøgelsen er klar. Du får svar på undersøgelse af den afdeling eller den læge, som har henvist dig.

Kontakt os ved mistanke om komplikationer

Kikkertundersøgelse af maven er en meget sikker undersøgelse. I meget sjældne tilfælde kan der dog optræde komplikationer. Det kan dreje sig om bivirkninger ved den beroligende medicin eller blødning eller hul i de undersøgte organer. Desuden



kan der i sjældne tilfælde opstå tandskader. Bliver du opmærksom på bivirkninger eller komplikationer, skal du kontakte os. Uden for vores træffetid skal du kontakte Lægevagten.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om kikkertundersøgelse af maven, kan du eventuelt læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'gastroskopi'.



Kontakt

**Ambulatorium for Medicinske Mave- og
Tarmsygdomme**
Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00