



Behandling med jern

Du lider af jernmangel og har endnu ikke haft effekt af anden medicinsk behandling. Derfor skal du i behandling med jern.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Du får jern som væske tilsat saltvand. Du får lagt et tyndt plastkrør (venflon) i en blodåre, og plastkrøret tilsluttes et drop, som giver dig væsken.

Behandlingen varer 1 time. Du kan regne med at komme til 1-2 behandlinger. Hvis du skal have 2 behandlinger, er den anden efter cirka 7 dage.

BIVIRKNINGER

Som regel er der ingen bivirkninger ved behandlingen. Dog kan du opleve gener, dér hvor plastkrøret har siddet. Hvis du oplever gener som ømhed og rødme, kan vi give dig en creme at smøre på.

Du kan opleve at få metalsmag i munden.

Den hyppigste bivirkning er hovedpine, som ses hos 3 % af patienterne.

Bliver du opmærksom på andre gener eller komplikationer, skal du kontakte os.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Ambulatorium for Medicinske Mave- og
Tarmsygdomme**
Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00