



Behandling med Humira

Du skal i behandling med medicinen Humira. Humira anvendes til behandling af moderate til svære tilfælde af Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, hvor anden behandling ikke har været effektiv.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Humira hæmmer betændelsestilstanden i tarmvæggen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Røntgenundersøgelse før behandlingen

Humira nedsætter immunforsvaret mod blandt andet tuberkulose. Har du ikke tidligere fået taget et røntgenbillede af lungerne i forbindelse med Remicade-behandling, skal du til denne røntgenundersøgelse, før du får Humira, for at sikre, at du ikke har tuberkulose.

Sådan tager du Humira

Ved de 2 første behandlinger med Humira skal du være i Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit. Ved de efterfølgende behandlinger skal du selv tage medicinen derhjemme. Sygeplejersken i dagafsnittet lærer dig, hvordan du tager Humira.

Du skal tage Humira som indsprøjtning i underhuden. Det kan svie lidt, når du tager indsprøjtningen. I sjældne tilfælde kan der opstå en allergisk reaktion med rødme på huden efter indsprøjtningen.

Samtale og udlevering af medicin

Du får udleveret Humira til cirka 8 ugers behandling. Efter de 8 uger skal du til samtale med en sygeplejerske i Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium, hvor du får taget blodprøver og får udleveret mere medicin. Du skal opbevare medicinen i køleskab.

Du får også udleveret et prøvesæt til forsendelse af en afføringsprøve, som du skal tage ugen efter, at du har taget næste indsprøjtning.

Supplerende medicin

Humira anvendes i de fleste tilfælde sammen med Imurel for at mindske risikoen for overfølsomhed og for at opnå den bedste virkning af behandlingen.

BIVIRKNINGER

Der er oftest ingen bivirkninger til Humira ud over det nedsatte immunforsvar. Eventuelle andre bivirkninger er oftest lettet til moderate og kræver ingen behandling. Følgende bivirkninger er set:

- Hovedpine
- Kvalme
- Opkastning
- Diarré
- Mavesmerter
- Træthed
- Svimmelhed
- Feber
- Udslæt
- Hoste
- Smerter i led.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Du kan ikke få behandling med Humira, hvis du har en infektion, som kræver behandling med antibiotika.

Personer med dårligt hjerte kan have problemer med at tåle Humira og må derfor ikke få denne behandling.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, og hvordan du skal tage medicinen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme

Sekretær:
Tlf. 97 64 08 72

Sygeplejerske:
Tlf. 97 64 07 74

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 9.00 – 12.00