REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND
– i gode hænder

PICC action card – information til hjemmesygeplejersken

INDIKATIONER

Cook PICC-line er et perifert anlagt centralt venekateter. PICC-line anvendes til patienter med behov for intravenøs behandling afkort til mellemlang varighed.

GENERELLE ANBEFALINGER

Anvend aldrig mindre end 10 ml sprøjter for at undgå skader på kateter og patientens blodkar.

Kontrollér altid tilbageløb ved at trække sprøjtens stempel 1-2 ml tilbage. Observerer du blod i sprøjten, er der frit løb, og du skal skylle med en ren 10 ml sprøjte.

Observér det hvide stykke ved indstikssted. Det må ikke glide længere ud, end at 3 streger kan ses (3 er ok). Er mere end 3 streger synlige, skal du kontakte os.

SKYLNING

Skyl med 10 ml isotonisk natriumklorid efter administration af lægemidler.

Skyl med 20 ml efter blodprøvetagning, administration af ernæring eller transfusion. Læg derefter heparinlås (5 ml Heparin 100 IE/ml).

HEPARINISERING

Hvis patienten får parenteral ernæring, skal der altid lukkes med heparinlås. Bruges PICC-line kun til tynde væsker, lukkes PICC-line kun med heparinlås, hvis kateteret ikke bruges igen indenfor 24 timer.

SKIFT AF VENTIL OG FIKSERING

Anvend altid aseptisk teknik, skift prop hver 3. dag, hvis kateter anvendes, ellers 1 gang om ugen.

Skift fikseringsplaster 1 gang om ugen, eller hvis plasteret er urent eller beskadiget.

BLODPRØVETAGNING

Tap et 5 ml spildglas.

Tag derefter den ønskede blodprøve. Det kan gøres på ventil eller på katetrets yderste spids. Ventilen skal efterfølgende altid skiftes.

Skyl efter med 20 ml natriumklorid.

BAD

Klip en plastikpose til et rør, sæt røret ud over forbindingen og tape på hver side.

SEPONERING AF KATETERET

Træk forsigtigt i kateteret. Hvis du mærker modstand, så prøv at skylle. Hvis det ikke hjælper, så kontakt os.

Komprimér i 2-3 minutter.

Send kun kateteret til dyrkning, hvis du ser noget mistænkeligt. Ellers kassér det.

… fortsættes

KONTAKT

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00