



Behandling med Prednisolon

Du skal i behandling med medicinen Prednisolon.
Prednisolon bruges ved mange forskellige tilstande:

- Bindevævssygdomme, fx svær leddegigt
- Overfølsomhed, fx høfeber og astma
- Blodsygdomme
- Sygdomme i fordøjelsesorganerne, fx betændelse i tarmen og leveren
- Transplantation af organer
- Visse kræftsygdomme
- Alvorlige tilfælde af betændelse
- Ophobning af vand i hjernen.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Prednisolon er et kunstigt binyrebarkhormon, der ligner og virker som et hormon, kroppen normalt producerer. Binyrebarkhormon dæmper symptomer som kløe, irritation og smerter.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Prednisolon findes som tabletter i styrkerne 1 mg, 2,5 mg, 5 mg og 25 mg.

Doseringen er individuel og afhænger i høj grad af årsagen til behandlingen. Du skal have en større dosis i begyndelsen af din behandling, end du skal senere i den såkaldte vedligeholdelsesbehandling.

Det er vigtigt, at du trapper gradvist ned med medicinen, når behandlingen skal afsluttes.

Du kan dele eller knuse tabletter, hvis det er nødvendigt.

BIVIRKNINGER

Prednisolon kan give følgende bivirkninger:

- Svedeture om natten, halsbrand, stigning i vægt og blødning i huden. Disse bivirkninger kan opstå, når du får behandling i længere tid, eller hvis du får store doser Prednisolon.
- Opstemthed, rastløshed, søvnløshed og forvirring. Disse bivirkninger kan opstå, da Prednisolon påvirker din psyke.
- Betændelse. Prednisolon nedsætter din krops modstand mod betændelse forårsaget af bakterier og virus.
- Afkalkning af knogler. Prednisolon kan bevirke, at dine knogler mister kalk. Derfor er det vigtigt, at du tager kalk og D3-vitamin, så længe du får Prednisolon.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Risiko for nedsat funktion af binyrerne

Under behandlingen med Prednisolon kan funktionen af dine binyrer blive nedsat. Det betyder, at der i visse belastende situationer og ved ulykker kan opstå behov for, at du skal have en højere dosis Prednisolon.

Risikoen for, at binyrerne svigter, kan opstå i op til 2 måneder efter, at du er stoppet med den medicinske behandling. Fortæl derfor altid læge, tandlæge, hospital og skadestue, når du er eller lige har været i behandling med Prednisolon.



REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND
– i gode hænder

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Ambulatorium for Medicinske Mave- og
Tarmsygdomme**
Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00