



Behandling af colitis ulcerosa med Simponi

Du skal i medicinsk behandling med lægemidlet Simponi (golimumab), der anvendes til behandling af colitis ulcerosa, hvor anden behandling ikke har været tilstrækkelig.

Behandlingens formål er at reducere dine symptomer, og der er ofte behov for en længerevarende vedligeholdelsesbehandling. Behandlingen er ikke helbredende.

Du vil normalt opleve en effekt af behandlingen inden for 6 til 8 uger efter opstart.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Simponi er et biologisk lægemiddel, der hæmmer betændelsestilstanden i din tarmvæg.

Simponi anvendes i de fleste tilfælde sammen med Imurel for at mindske risikoen for overfølsomhed og for at opnå den bedste virkning af behandlingen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal give dig selv Simponi som en indsprøjtning i underhuden. Den pen eller sprøjte, du skal bruge, hedder en Smart Ject-pen eller -sprøjte. Du skal give dig selv indsprøjtningen hver 4. uge.

Simponi findes i 50 mg eller 100 mg doser. Din dosis afhænger af din vægt. Uanset hvilken dosis du skal have, skal du have Simponi hver 4. uge.

En sygeplejerske i Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit lærer dig, hvordan du skal tage medicinen. De første 2 behandlinger foregår af samme grund i Dagafsnittet.

Mens du er i behandling, skal du til samtale med en sygeplejerske i Dagafsnittet hver 8. uge. Her får du

udleveret din medicin. Ved samtalen skal du have taget en blodprøve.

Når du kommer til samtale og medicinudlevering, får du også udleveret et prøvesæt, som du skal bruge til at lave en afføringsprøve. Du skal lave denne prøve og sende den 1 uge efter, at du har taget næste indsprøjtning.

Blodprøven og afføringsprøven bruges til at sikre, at behandlingen har den ønskede effekt.

Ved behov vil der være mulighed for at få en lægesamtale. Vi vil løbende vurdere, om behandlingen skal fortsætte.

BIVIRKNINGER

Eventuelle bivirkninger er oftest lette til moderate og kræver ingen behandling. Du kan opleve følgende bivirkninger:

- Infektion i de øvre luftveje, ondt i halsen, hæshed og løbende næse
- Hovedpine, svimmelhed, mavesmerter, kvalme, influenza, feber, udslæt ved stikkestedet og kløe.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os i tilfælde af infektion

Du må ikke få behandling med Simponi, hvis du har en infektion, som kræver antibiotisk behandling.

Simponi kan nedsætte dit immunsystem, og det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du har:

- infektion
- leverbetændelse
- tuberkulose.



Du skal også kontakte os, hvis du har været i kontakt med nogen, der har tuberkulose.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Du er velkommen til at kontakte sygeplejerskerne i Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit under hele dit behandlingsforløb.



Kontakt

**Ambulatorium for Medicinske Mave- og
Tarmsygdomme**
Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00