

Udtagelse af vævsprøve fra leveren ved hjælp af ultralyd

Du skal have taget en vævsprøve (biopsi) fra leveren.

Ved en leverbiopsi udtager vi et lille stykke levervæv. For at sikre, at vævsprøven tages fra det rigtige sted, vil vævsprøvetagningen foregå ved hjælp af en ultralydsskanning. Vævsprøven bruges til at stille en diagnose eller til at vurdere effekten af den behandling, du har fået for din leversygdom.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Inden undersøgelsen får du målt din puls og dit blodtryk.

Under undersøgelsen ligger du på ryggen med højre arm under nakken. Lægen tager vævsprøven imellem de nederste ribben i højre side. Huden over indstiksstedet desinficeres med sprit, og du får lagt lokalbedøvelse i det område, hvor lægen stikker dig. I forbindelse med anlæggelsen af lokalbedøvelsen vil du føle, at det svier og spænder i huden, men denne fornemmelse vil hurtigt aftage. Du vil hele tiden kunne mærke berøring, men ikke smerte.

Når du er lokalbedøvet, udtager vi vævsprøven fra leveren ved hjælp af en særlig kanyler.

Undersøgelsen varer med forberedelse cirka 30 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vær opmærksom på medicin

- Får du insulin om morgenen, skal du undlade at tage denne. Medbring insulin og blodsukkerapparat til undersøgelsen.
- Får du tabletbehandling mod sukkersyge, skal du tage din medicin, som du plejer.
- Lægen, der har besluttet, at du skal til vævsprøvetagning, skal gerne have taget stilling til, om du skal holde pause med blodfortyndende

medicin, inden du skal have taget vævsprøven.

Hvis du ikke har fået besked herom, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsesdagen med henblik på regulering af den blodfortyndende medicin.

- Får du Plavix® (clopidogrel) eller Hjertemagnyl®, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsen med henblik på, om du skal holde pause med disse præparater.
- Får du anden medicin, må du tage den om morgenen med lidt vand.

Mød fastende til aftalen

Du skal faste inden undersøgelsen. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise eller drikke fra 4 timer før undersøgelsen.
- Du må ikke ryge fra 4 timer før undersøgelsen.

EFTER UNDERSØGELSEN

Du vil få målt blodtryk og puls flere gange i timerne efter undersøgelsen.

Efter behandlingen skal du faste i 2 timer og blive liggende i sengen i 4 timer. Efter 4 timer må du rejse dig med hjælp fra personalet.

Du kan forvente at skulle overnatte til dagen efter.

NÅR DU KOMMER HJEM

Tag smertestillende ved behov

Du kan opleve ubehag eller smerte i højre skulder samt lettere smerter ved indstiksstedet efter undersøgelsen. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb.



Vær opmærksom på disse symptomer

I de første 24 timer efter undersøgelsen skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten, hvis:

- du bliver svimmel
- du bliver utilpas
- du får smerter
- du får feber.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Vi har svaret på vævsprøven i løbet af 10-14 dage. Vi aftaler med dig, om du skal have svar per telefon, hos din egen læge eller ved en samtale i Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om vævsprøve fra leveren, kan du eventuelt læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'leverbiopsi'.



Kontakt

Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme

Tlf. 97 64 28 00

Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00